

广西种子植物小资料

陈秀香

(广西中医药研究所)

NEW RECORDS OF SPERMATOPHYTE FROM GUANGXI

Chen Xiu-xiang

(Guangxi Institute of Traditional Medical & Pharmaceutical Sciences)

关键词 山椒子; 西沙黄细心; 披针叶本藨木; 大花小姬苗(变种); 网子度量草; 伞花马钱; 大叶吊兰; 地理分布

Key words *Uvaria grandiflora*; *Boerhavia erecta*; *Bennettiodendron lanceolatum*; *Mitrasacme pygmaea* R. Br. var. *grandiflora*; *Mitreola reticulata*; *Strychnos umbellata*; *Chlorophytum malayense*; Geographic distribution

几年来, 我所在中草药资源调查工作中, 发现一些我国及广西未曾记录过的植物, 现整理成文, 以供有关部门参考。本文引用的标本均收藏在广西中医药研究所植物标本室(GXMI)。

山椒子 水蜜桃(博白)

番荔枝科 Annonaceae

Uvaria grandiflora Roxb. in Fl. Ind. 2:665. 1824; 李秉滔, 植物分类学报 14(1), 98. 1976; 蒋英, 李秉滔, 中国植物志 30(2): 26, 图版10. 1979。

广西东南部: 博白县, 浪平公社, 水库边1971年5月9日, 王鉴均22479; 北流县, 隆盛公社, 天堂, 坡地疏林中, 1977年9月26日北流调查队8—4407。

分布: 广东南部, 广西东南部; 印度、缅甸、泰国、越南、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚。广西分布新记录。

本种特征: 攀援灌木, 高约3米; 叶背密被黄褐色绒毛; 花单生, 紫红色, 有香气, 大形, 直径达9厘米。

西沙黄细心

紫茉莉科 Nyctaginaceae

Boerhavia erecta Linn. Sp. Pl. 3. 1753; 梁元肇, 植物学报 20(2): 171. 1978。

广西南部: 宁明县, 夏石公社, 夏石大队, 干旱的旷野地, 偶见, 1982年6月18日, 陈秀香36079。

分布: 西沙群岛、广西南部; 新加坡、印度尼西亚、太平洋岛屿。广西分布新记录。

本种与黄细心 *B. diffusa* Linn. 相似, 不同之处在于直立草本, 根细长, 非肉质, 叶较小, 卵状椭圆形, 长1—2.5厘米, 宽0.6—1.5厘米, 两面被红色腺毛; 二歧聚伞花序多分枝; 花冠管状, 5裂, 内面白色, 外有紫红色条纹。

披针叶本藨木(新拟)

大风子科 Flacourtiaceae

Bennettiodendron lanceolatum Li in Journ. Arn. Arb. 25, 309. 1944; 吴征镒等, 植物分类学报 6(2): 231. 1957。

广西西北部: 隆林县, 克长公社, 梅达大队1977年8月12日, 钟新发3—34201。

分布: 贵州; 广西西北部。广西分布新记录。

本种特征：灌木；叶狭长披针形，边缘具粗锯齿。浆果球形。

大花小姬苗（变种）

马钱科 Loganiaceae

Mitrasacme pygmaea R. Br. var. *grandiflora* (Hemsl.) Leenhouts in Bull. Jard. Bot. Etat. Brux. 32: 455. 1962; C. Tirel-Roudet in Fl. Camb. Laos et Vietnam 13: 86. 1972. — *M. polymorpha* R. Br. var. *grandiflora* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 118. 1889.

广西南部：北海市，高德公社，车里大队，草地，山坡，草本，高约15厘米，1976年11月10日，北海植物调查队1—7073（李秉滔先生定名）；钦州县，犀牛脚公社，六耳环大队，1976年11月23日，钦州植物调查队1—3880。

分布：广西南部；越南也有。我国分布新记录。

本变种与原变种不同之处在于叶散生于茎上，线状椭圆形，长4—13毫米；花较大，花冠黄色，筒状，长7—8毫米。

网子度量草（新拟）

马钱科 Loganiaceae

Mitreola reticulata Tirel in Adansonia ser. 2, 9: 119. 1969.; C. Tirel-Roudet in Fl. Camb. Laos et Vietnam 13: 77. fig. 13. 1972.

广西南部：龙州县，金龙公社，高山大队，扳闭，归山，石山，草本，高约30厘米，1977年6月6日，陈秀香2—0019。

分布：广西南部；越南。我国分布新记录。

本种外形相似毛叶度量草，*M. pedicellata* (Gmel.) Benth. 其不同之处在于叶两面无毛；蝎尾聚伞花序缩短呈头状，分枝长0.5—1厘米；花无柄，排裂紧密，柱头无柄；种子球形，网状。

伞花马钱

马钱科 Loganiaceae

Strychnos umbellata (Lour.) Merr. in Philip. Journ. Sci 15: 252. 1919; Merr. et Chun, Sunyatsenia 2: 308. 1935. 海南植物志3: 200. 1974; 中国高等植物图鉴3: 381, 图4716, 1974. — *Cissus umbellata* Lour. Fl. cochinch. 84. 1790.

广西南部：钦州县，犀牛脚公社，今古大队，沙滩，1976年11月24日，钦州植物调查队1—3884。

分布：广东（海南岛）、广西南部；越南。广西分布新记录。

本种特征：藤状灌木，小枝无卷曲钩。叶卵形。聚伞花序三歧分枝；花多数，4基数，冠管极短，辐状。浆果球形，直径约1.3厘米。

大叶吊兰

百合科 Liliaceae

Chlorophytum malayense Ridley in Fl. Malay Penins 5: 341. 1925; 中国植物志14: 43. 1980.

广西南部：龙州县，逐卜公社，弄岗大队。林下灌丛中，1978年4月18日，龙州植物调查队2—516。

分布：云南（西双版纳）、广西南部；老挝、越南、泰国和马来西亚。广西分布新记录。

本种特征：草本，根状茎近直立，粗而长叶狭矩圆状披针形或披针形，连柄长50—70厘米，宽2—5厘米，干后变黑色，花序多分枝，花白色。