DOI: 10.11931/guihaia.gxzw201909064

韩丹宇, 于磊, 韩朝君, 等. 水曲柳中 *MYBL2* 基因表达特征分析 [J]. 广西植物, 2021, 41(6): 997–1003.HAN DY, YU L, HAN ZJ, et al. Characteristic analysis of *FmMYBL2* gene expression in *Fraxinus mandshurica* [J]. *Guihaia*, 2021, 41(6): 997–1003.

水曲柳中 *MYBL2* 基因表达特征分析

韩丹宇¹, 于磊^{1,2}, 韩朝君³, 张振峰³, 张旭^{1,2}, 刘璋^{1,2}, 詹亚光^{1,2*}

(1. 东北林业大学 生命科学学院, 哈尔滨 150036; 2. 东北林业大学林木遗传育种国家重点实验室, 哈尔滨 150036; 3. 黑龙江省大海林林业局, 黑龙江 牡丹江 157000)

摘要: MYB 转录因子家族是植物中最大的转录因子家族之一, 参与植物生长、繁殖和代谢的各个时期, 能通过多种方式参与植物抗逆生长。该文在水曲柳中克隆 *FmMYBL2* 基因, 利用生物信息学分析其结构和表达特征, 并构建 *FmMYBL2* 蛋白的系统进化树。对水曲柳幼苗进行低温胁迫、盐胁迫处理以及激素分子诱导处理 (包括 ABA、IAA、GA₃、JA、SA)。分别在 0、1、3、6、12、24、48 h 取样, 利用实时荧光定量 PCR 对上述处理样品中 *FmMYBL2* 基因进行定量分析, 并分析了 *FmMYBL2* 的时空表达特征。结果表明: (1) 克隆得到的 *FmMYBL2* 基因全长为 762 bp, 编码 253 个氨基酸。(2) *FmMYBL2* 蛋白是亲水性蛋白, 氨基酸序列比对表明其与棉花同源关系较近。(3) 荧光定量分析表明, *FmMYBL2* 基因响应低温胁迫和盐胁迫, 同时 ABA、IAA、GA₃、JA、SA 共同调控该基因表达。(4) 在低温处理 1 h、盐胁迫 48 h 时, 虽然 *FmMYBL2* 基因表达量最高, 激素诱导后表达量持续波动, 但其能在短时间内迅速响应。(5) *FmMYBL2* 基因在根、芽、花、种子中均有表达, 雄花中的表达量最高。该研究结果为深入研究 *MYBL2* 基因功能和水曲柳抗逆生长的调控奠定基础。

关键词: 水曲柳, *MYBL2* 转录因子, 基因克隆, 抗逆, 生物信息学分析

中图分类号: Q943; S792.41 文献标识码: A 文章编号: 1000-3142(2021)06-0997-07

Characteristic analysis of *FmMYBL2* gene expression in *Fraxinus mandshurica*

HAN Danyu¹, YU Lei^{1,2}, HAN Zhaojun³, ZHANG Zhenfeng³, ZHANG Xu^{1,2},
LIU Zhang^{1,2}, ZHAN Yaguang^{1,2*}

(1. College of Life Sciences, Northeast Forestry University, Harbin 150036, China; 2. State Key Laboratory of Tree Genetics and Breeding, Northeast Forestry University, Harbin 150036, China; 3. Dahailin Forestry Bureau, Mudanjiang 157000, Heilongjiang, China)

Abstract: The MYB transcription factor family is one of the largest transcription factor families in plants and it is involved in all stages of plant growth, reproduction and metabolism, and can participate in plant stress resistance growth in a variety of ways. The *FmMYBL2* gene was cloned in *Fraxinus mandshurica*, and its structure and expression characteristics were analyzed using bioinformatics and a phylogenetic tree of *FmMYBL2* was constructed. Low temperature, salt and hormone molecules (including ABA, IAA, GA₃, JA, SA) were used to induce *F. mandshurica* seedlings. Samples were taken at 0, 1, 3, 6, 12, 24, 48 h. Quantitative analysis of *FmMYBL2* gene in the treated

收稿日期: 2020-01-27

基金项目: 国家重点研发计划课题(2017YF D0600605-01); 国家自然科学基金(31270697); 黑龙江省应用技术与开发计划项目(GA19B201); 东北林业大学大学生创新课题(201910225154) [Supported by the National Key Research and Development Program of China (2017YF D0600605-01); the National Natural Science Foundation of China (31270697); Applied Technology Research and Development Program of Heilongjiang Province (GA19B201); Undergraduate Innovation Program of Northeast Forestry University (201910225154)].

作者简介: 韩丹宇(1999-), 研究方向为植物基因工程, (E-mail) handanyubio@163.com。

*通信作者: 詹亚光, 博士, 教授, 研究方向为林木遗传育种, (E-mail) yaguangzhan@126.com。

samples. The temporal and spatial expression characteristics of *FmMYBL2* were analyzed. The results were as follows: (1) The *FmMYBL2* gene was 762 bp in length and encodes 253 amino acids. (2) *FmMYBL2* encoded a hydrophilic protein. Amino acid sequence alignment showed that it was closely related to *Gossypium hirsutum*. (3) Quantitative fluorescence analysis showed that *FmMYBL2* gene responded to low temperature and salt stress. At the same time, ABA, IAA, GA₃, JA and SA jointly regulated the expression of *FmMYBL2* gene. (4) The gene expression was the highest under low temperature treatment for 1 h and salt stress for 48 h. After hormone induction, the expression of this gene fluctuates continuously, but it can respond quickly in a short time. (5) Expression of this gene was observed in roots, buds, flowers and seeds and the male flowers had the highest expression. The results of this study provide reference for further studying the function of *MYBL2* gene and the regulation of stress resistance of *Fraxinus mandshurica*.

Key words: *Fraxinus mandshurica*, MYBL2 transcription factor, gene clone, stress resistance, bioinformatics analysis

近年来,随着全球环境不断遭到破坏,处于逆境中的植物数量急剧增加,逆境胁迫使得植物细胞大量脱水,膜系统功能紊乱(杨晓慧等,2006)对植物生长极其不利,所以研究植物抗逆途径是目前当务之急。MYB 转录因子家族与植物抗逆密切相关,是植物中最大的转录因子家族之一,参与植物生长繁殖的各个过程(Payne et al., 2000; Suo et al., 2003; Nguyen & Lee, 2016)。水曲柳 MYBL2 蛋白是一种 R2R3-MYB 蛋白,这类蛋白结构域是一种端粒结合蛋白,能参与植物的胁迫应答和激素诱导,还可与 bHLH 和 WDR 转录因子复合物结合调控花色素基因的表达(Zhu et al., 2015; An et al., 2019)。研究发现,棉花 *GhMYB73* 基因、拟南芥 *AtMYB2* 基因可通过提高渗透胁迫抗性来提高植物耐盐性,并使一些参与 ABA 途径中的非生物胁迫诱导的相关基因转录水平显著提高(Yoo et al., 2005; Zhao et al., 2019)。过表达 *AtMYB44* 基因对 ABA 诱导的气孔关闭反应更敏感,对干旱及盐胁迫的耐受性增强(Choonkyun et al., 2008); *AtMYB60* 基因在盐胁迫及 ABA 影响下表达受阻,植物生长受限。MYB 转录因子亦可参与水稻抵御逆境(罗成科等,2015)。除此之外,MYB 家族还有着调控花青素合成以抵抗逆境的功能。在 bHLH 突变体拟南芥中就发现 BoMYB2 转录因子与 BoHLHs 结合共同调控花青素的合成(Chiu & Li, 2012)。花青素通过提高超氧化物歧化酶、抗坏血酸氧化酶和谷胱甘肽还原酶的活性来提高寒冷诱导的抗性(Zhu et al., 2013)。成熟参数相近的红芒果和青芒果在冷藏 3 周后,红芒果因含有更多的花青素积累,而表现出对冷害更强的抗性(Sivankalyani et al., 2016)。野生型拟南芥在接受外源 ABA 诱导时茎尖中的花青素不断积累,此现象依赖于 *AtMYB75* 基因及一些其他能被 ABA 诱导的基因(陈俊洁等,2020)。水杨酸(SA)和茉莉

酸(JA)也对植物抗逆起着重要作用。水杨酸和茉莉酸可以通过加强植物自身的防御信号来诱导植物合成更多的防御类化合物,有助于植物抗逆;通过研究枸杞中 SA 结合蛋白 LcSABP 发现,LcSABP 通过提高内源性 SA 含量,促进活性氧的清除以及调节逆境相关转录因子的表达而抵御逆境(Li et al., 2019);JA 还可延长果蔬保存期(赵曼如等,2020);JA 在使植物适应高光照和高温胁迫的组合中起着重要作用(Balfagón et al., 2019)。

水曲柳(*Fraxinus mandshurica*)是木犀科落叶乔木,是东北地区珍贵的硬阔用材树种,并且是国家重点保护的野生植物之一。由于目前对多种抗逆途径的综合研究较少,所以本文对水曲柳中 *FmMYBL2* 基因进行了克隆和分析,并研究了水曲柳抗逆能力、激素诱导表达和不同部位表达,为水曲柳对逆境胁迫适应机制提供依据,对水曲柳资源的开发和优化具有重要的理论意义和实用价值。

1 材料与方法

1.1 材料的处理

1.1.1 非生物胁迫与激素诱导的取材 取实验室中由水曲柳种子种植,长势均一,并在温室中经恒温、恒湿、恒光强培养 45 d 的实生苗 150 株。因其幼嫩,次生代谢产物较少,故在进行诱导胁迫时利于检测基因表达量的变化。对其进行 4 °C 低温、200 mmol · L⁻¹ NaCl 的胁迫处理,并用浓度均为 100 μmol · L⁻¹ 的植物激素 ABA、GA₃、IAA、JA、SA 分别进行激素信号诱导处理,而对照组不作任何处理。实验组和对照组分别在 0、1、3、6、12、24、48 h 时取样,并将样品放入液氮冷冻,置于-80 °C 的冰箱中保存。

1.1.2 水曲柳不同部位的取材 根、茎、叶取自上述培养 60 d 的实生幼苗 5 株。雄花、雌花、芽以及种子取自东北林业大学林场中不同月份长势均

一、良好的成熟水曲柳植株(共取自 5 棵树,至少重复三次)。在超净工作台中对材料进行消毒,以待后续检测 *MYBL2* 基因的表达量。对照组除消毒外同样不做任何处理。将消毒后的样品分别放入液氮冷冻,置于 $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的冰箱中保存。

1.2 研究方法

1.2.1 选用的内参基因和算法 引入在水曲柳中表达量相对稳定的持家基因 *TU* (任小龙等, 2015), 以便于获得更加准确的基因表达量, 同时也方便对数据进行比对校正。算法使用 $2^{-\Delta\Delta\text{CT}}$ (ΔCT 处理组 $-\Delta\text{CT}$ 对照组)。

1.2.2 *FmMYBL2* 基因克隆方法 应用 Tris-CTAB 法分别提取样品根、茎、叶、芽、雄花、雌花、种子的 RNA (每次取各样品 0.5 g)。因 CTAB 与蛋白质和多糖类物质可结合形成复合物, 利用有机溶剂分离该复合物与核酸, 并加入沉淀剂, 可以得到不同样

品的 RNA。利用反转录试剂盒将得到的 RNA 反转录成 cDNA, 将其与本研究室前期所测得的水曲柳转录组数据进行比对, 根据 cDNA 序列设计引物(表 1), 克隆 *MYBL2* 基因编码区全长(图 1)。进行多次 PCR (反应体系为 $20\text{ }\mu\text{L}$ 。其中, 模板 cDNA $2\text{ }\mu\text{L}$, 正反引物各 $1\text{ }\mu\text{L}$, dNTP $1.6\text{ }\mu\text{L}$, rTaq $0.2\text{ }\mu\text{L}$, Buffer $2\text{ }\mu\text{L}$, ddH₂O $12.2\text{ }\mu\text{L}$), 并通过凝胶回收纯化产物, 应用 pMD18-T 载体连接后转化进入 JM109 感受态细胞, 并在加有抗性的培养基上培养单菌落, 选取多个菌落进行菌液验证, 然后送至公司进行测序。

1.2.3 *FmMYBL2* 在响应逆境胁迫及激素信号表达下的分析方法 根据 *FmMYBL2* 基因序列设计荧光定量 PCR 引物(表 1), 应用荧光定量 PCR 技术分别分析 *FmMYBL2* 基因在 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 低温胁迫、NaCl 胁迫、IAA、ABA、GA₃、JA、SA 激素诱导下的表达量。样品均进行 3 次重复检测。利用 $2^{-\Delta\Delta\text{CT}}$ 法计算表达量。

表 1 *FmMYBL2* 基因序列克隆以及荧光定量 PCR 的引物序列设计

Table 1 Design primer sequence for cloning *FmMYBL2* gene and quantitative real-time PCR

引物名称 Primer name	引物序列 Primer sequence	备注 Remark
FmMYBL2-F	5'-TTGGCTCAATGGGAAGGTCTCC-3'	基因克隆 Gene cloning
FmMYBL2-R	5'-TTATTTCAATTTCCAGGCCTCTGTAGC-3'	基因克隆 Gene cloning
qFmMYBL2-F	5'-TGCTGGCGTTTCGCTTCTCTAA-3'	定量 Quantitative
qFmMYBL2-R	5'-GAGACCATTTGTTACCAAGAAGACTG-3'	定量 Quantitative

2 结果与分析

2.1 基因克隆

克隆获得了 *FmMYBL2* 的基因序列(图 1), 可知该基因全长 762 bp, 编码 253 个氨基酸。

2.2 氨基酸序列比对及构建基因进化树

应用 NCBI 里的 Protein BLAST 对 *FmMYBL2* 进行同源序列比对, 利用相似度较高的同源序列构建基因进化树(图 2)发现 *FmMYBL2* 与棉花、巴旦木、可可、梅花等的氨基酸序列相似性较高, 说明它们亲缘关系较近。

2.3 氨基酸理化性质的分析及 *FmMYBL2* 的疏水性预测

应用 ProtParam 在线工具分析预测 *FmMYBL2* 氨基酸的理化性质。结果表明, *FmMYBL2* 由 253 个氨基酸组成, 其中有 29 个带负电的氨基酸残基 (Asp + Glu), 有 38 个带正电的氨基酸残基 (Arg + Lys)。不稳定指数为 49.94, 所以是不稳定蛋白质。蛋白质的疏水性对蛋白质的影响巨大, 主要

表现在蛋白质的构型、稳定性、以及其功能。应用 Proscale 在线工具对 *FmMYBL2* 蛋白进行疏水性分析(图 3)。分析表明, *FmMYBL2* 有 21 个亲水区域和 10 个疏水区域, 总平均疏水性为 -0.660 , 是亲水性蛋白。*FmMYBL2* 蛋白的疏水区域有利于蛋白质向内部折叠形成二级结构, 进一步形成结构域, 并有利于蛋白形成 α 螺旋, 保证其自身稳定性。应用在线软件 ExPASy 中的 Compute pI/Mw 得出 *FmMYBL2* 蛋白质的等电点为 9.02, 所以该蛋白在 PH 为 9.02 时最不稳定且溶解度最小, 易于沉淀析出。同时蛋白质的黏度、渗透压、膨胀性以及导电能力均为最小。

2.4 *FmMYBL2* 表达量在 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 低温胁迫、NaCl 胁迫下的变化趋势

水曲柳幼苗经不同胁迫处理时, *FmMYBL2* 基因表达量均较对照 (*TU*) 上调表达, 表达量随时间的变化而波动明显(图 4)。用 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 低温处理水曲柳幼苗时, *FmMYBL2* 基因表达量在 0、1、3、6、12、24、48 h 总体呈现先下降后上升的趋势。在其被胁迫 1 h 后 *FmMYBL2* 相对表达量最高, 为对照组

图1 *FmMYBL2* 基因编码区的序列全长

Fig. 1 Sequence length of the coding region of the *FmMYBL2* gene

的7倍,而处理6、12 h时的表达量均低于对照组,其中6 h表达量为对照组的0.54倍,12 h表达量最低,为对照组的0.10倍。用NaCl胁迫处理水曲柳幼苗时,*FmMYBL2*基因表达量总体呈现先下降后上升的趋势。胁迫处理1 h后,实验组基因表达量是对照组的1.20倍,而处理3、6、12 h后表达水平平均低于对照组表达量,48 h表达量最高,是对照组的2.41倍。

2.5 *FmMYBL2* 表达量在激素信号诱导下的变化趋势

水曲柳幼苗经不同激素信号诱导,表达模式变化不同(图5)。用ABA处理水曲柳幼苗时,其*FmMYBL2*表达量波动明显。其中除处理6 h后*FmMYBL2*表达量达到对照组的1.05倍以外,其余处理时间基因表达均被抑制,低于正常水平。其中实验组在经ABA诱导1 h后表达量最低,是对照组的0.19倍。用IAA处理水曲柳幼苗后,*FmMYBL2*表达量的变化十分显著,其中诱导处理24 h后表达量达到峰值,是对照组的11.80倍。除

处理1 h仅为对照组的0.65倍外,其余均超过对照组基因表达量。用GA₃处理水曲柳幼苗时,3 h达到最高表达量,是对照组的2.68倍,且处理1、12、48 h后低于对照组,3、6、24 h时均高于对照组。JA处理水曲柳幼苗(图6)3 h后,*MYBL2*基因的相对表达量最高,3、6 h表达量不断下降,而后又上升,表达量不断波动。SA处理1 h后基因的表达量虽达到顶峰,而后不断波动,但始终维持在对照组10倍以内。

2.6 *FmMYBL2* 在水曲柳不同部位、月份的表达量分析

在测水曲柳不同部位的基因表达时(图7),本研究选择的内参为水曲柳微管基因*TU*。基因相对表达量的算法为 $2^{-\Delta\Delta CT}$ (ΔCT =基因的表达量-内参的表达量)。该基因在不同部位的表达量往往是不同的。经研究发现,*TU*在水曲柳的花和芽中表达量较高,而在根茎叶中表达量较低。*FmMYBL2*基因在茎叶中几乎没有表达(设对照组数值为1),在根中表达也很少,而在花中表达量较

图 2 FmMYBL2 蛋白发育进化树的构建

Fig. 2 Construction of FmMYBL2 protein evolutionary tree

图 3 FmMYBL2 蛋白疏水性分析

Fig. 3 Hydrophobicity analysis of FmMYBL2 protein

高。其中, *FmMYBL2* 在根中的表达量是 1.38 倍、在雌花中的表达量是 13.38 倍、在雄花中的表达量是 20.78 倍。在测定水曲柳不同月份的基因表达时(图 8), 仍然选择 *TU* 作为内参基因, 研究发现 *FmMYBL2* 表达量在 8 月的表达量最高, 达到了对照组的 10 倍, 在 9 月时则逐渐下降。

3 讨论与结论

本研究通过生物软件分析 *FmMYBL2* 基因序

列, 得知其为亲水性蛋白, 且不存在信号肽。氨基酸序列比对发现其与棉花等植物的氨基酸序列相似性较高, 说明它们亲缘关系较近, 可能有相似的作用规律。并进行了水曲柳中 *MYBL2* 基因在不同模式下的相对表达量以及寒冷和激素诱导的研究。

植物在低温胁迫下由于冷应激反应, 会导致其与防御相关的蛋白含量降低 (Makoto & Setsuko, 2007), 对植物产生不良影响, 所以本研究对 *FmMYBL2* 基因进行定量研究, 观测其在冷应激反应下的表达及其对植物的影响。通过定量实验得出, *FmMYBL2* 在被低温胁迫 1 h 后表达量最高, 12 h 时的表达量最低。基因表达量的极大改变说明其响应了寒冷胁迫, 这与拟南芥 *MYB15* 基因表达量受冷胁迫波动类似 (Agarwal et al., 2006)。此外, 用 NaCl 胁迫处理水曲柳幼苗时, *FmMYBL2* 基因表达量呈现先下降后上升的趋势。胁迫处理 48 h 后表达量最高, 证明 *FmMYBL2* 基因有增加水曲柳抗盐性的能力, 在处理时基因表达量迅速上升。此外, 在植物激素 ABA、IAA、 GA_3 、JA、SA 的诱导下, *FmMYBL2* 基因的表达也受到不同的影响, 且对 IAA 的响应最为明显, 经 IAA 处理 24 h 后的水曲柳幼苗中 *MYBL2* 表达量为对照组的 11.80 倍。在 ABA 和 GA_3 的信号诱导下, 该基因表达量有显

图中字母 a、b、c、d、e、f、g、h 为多重比较分析的字母标记。(将 *FmMYBL2* 基因表达量平均数从大到小顺序排列,然后在最大的平均数上标上字母“a”;将该平均数依次和其以下各平均数相比,凡差异不显著的都标字母“a”,直至某一个与之相差显著的平均数则标以字母“b”。再以该标有“b”的平均数为标准,与各个比它大的平均数比,凡不显著的也一律标以字母“b”;直至某一个与之相差显著的平均数则标以字母“c”;如此重复下去,直至最小的一个平均数有了标记字母为止。)

In the figure, the letters a, b, c, d, e, f, g and h are alphabetic labels for multiple comparative analysis. (The average number of *FmMYBL2* gene expression was arranged in order from large to small. Put the letter “a” on the largest average. The average number is sequentially compared with the subsequent averages, and the letter “a” is marked with a significant difference, and the letter “b” is marked with a significant difference. Then taking the average number marked with “b” as the standard. The letter “b” is marked with insignificant differences, and the letter “c” is marked with significant differences. Repeating this process until the smallest average is marked with a letter.)

图4 4 °C、NaCl胁迫下 *FmMYBL2* 的相对表达量
Fig. 4 Relative expression of *FmMYBL2*
under 4 °C and NaCl stress

著的波动。由此可见, *FmMYBL2* 响应激素信号,可在植物因抵抗逆境胁迫而导致激素含量改变时响应,辅助植物抗逆。植物自身的水杨酸与茉莉酸就有着调控气孔关闭的生理功能,且植物伤信号能引起 JA 和 SA 含量的增加。本研究结果发现,在 JA 和 SA 诱导下 *MYBL2* 基因表达量升高,说明在植物因胁迫造成细胞损伤时,JA、SA 在被诱导含量增加的同时也会使 *FmMYBL2* 表达量上升,共同抵御胁迫。

本研究检测了水曲柳不同部位基因的表达量,研究发现 *FmMYBL2* 在花、芽中表达量最高,在茎叶中表达量很少。因其在不同的组织和器官里表达量不同,说明 *FmMYBL2* 的表达具有组织特异性。在检测不同月份的表达时,本研究发现 5 月时基因的表达量之所以高达 6 倍,可能是因为水曲柳的花

图中字母 a、b、c、d、e、f、g、h、i、j 为多重比较分析的字母标记。(标记原理同上)下同。

In the figure, the letters a, b, c, d, e, f, g, h, i and j are alphabetic labels for multiple comparative analysis. (The marking principle is the same as above.) The same below.

图5 ABA、IAA、GA₃诱导下 *FmMYBL2* 的相对表达量
Fig. 5 Relative expression of *FmMYBL2*
induced by ABA, IAA and GA₃

图6 JA、SA诱导下 *FmMYBL2* 的相对表达量
Fig. 6 Relative expression of *FmMYBL2*
induced by JA and SA

期在 5 月左右,而花中花青素的积累使得 *FmMYBL2* 基因的表达量上升。7—8 月基因表达量逐渐上升,8—9 月逐渐下降,可能是 7—8 月温度较适宜植物生长,不需要太多代谢产物抵抗逆境。综上所述,水曲柳 *FmMYBL2* 基因可参与植物抗逆境胁迫和激素信号的响应,无论是通过自身表达量的变化增强植物抗逆性,还是通过影响次生代谢产物花青素的含量,都能帮助植物抗逆。可见,该基因在水曲柳生长发育中的作用十分重要。

参考文献:

AGARWAL M, HAO Y, KAPOOR A, et al., 2006. A R2R3 type MYB transcription factor is involved in the cold

图7 *FmMYBL2* 在水曲柳不同部位的表达量
Fig. 7 Expression level of *FmMYBL2* in different parts of *Fraxinus mandshurica*

图8 *FmMYBL2* 在水曲柳不同月份的表达量
Fig. 8 Expression level of *FmMYBL2* of *Fraxinus mandshurica* in different months

regulation of CBF genes and in acquired freezing tolerance [J]. *J Biol Chem*, 281(49):37636-45.

AN JP, WANG XF, ZHANG XW, et al., 2019. An apple MYB transcription factor regulates cold tolerance and anthocyanin accumulation and undergoes MIEL1-mediated degradation [J]. *Plant Biotechnol J*, DOI:10.1111/pbi.13201.

BALFAGÓN DAMIÁN, SENGUPTA SOHAM, GÓMEZ-CADENAS AURELIO, et al., 2019. Jasmonic acid is required for plant acclimation to a combination of high light and heat stress [J]. *Plant Physiol*, DOI:10.1104/pp.19.00956.

CHEN JJ, MEI S, HU YR, 2020. Abscisic acid induces anthocyanin synthesis in *Arabidopsis* seedlings [J]. *Guihaia*, 40(8): 1169-1180. [陈俊洁, 梅松, 胡彦如, 2020. 脱落酸激素诱导拟南芥幼苗中花青素的合成 [J]. *广西植物*, 40(8): 1169-1180.]

CHIU LW, LI L, 2012. Characterization of the regulatory network of BoMYB2 in controlling anthocyanin biosynthesis in purple cauliflower [J]. *Planta*, 236(4):1153-1164.

CHOONKYUN J, JUN SS, SANG WH, et al., 2008. Overexpression of AtMYB44 enhances stomatal closure to confer abiotic stress tolerance in transgenic *Arabidopsis* [J]. *Plant Physiol*, 146(2):623-635.

LUO CK, XIAO GJ, LI Q, 2015. Research advance of the

transcription factors related to stress resistances in rice [J]. *Guihaia*, 35(6):942-947. [罗成科, 肖国举, 李茜, 2015. 水稻逆境相关转录因子研究进展 [J]. *广西植物*, 35(6):942-947.]

LI QIAN, WANG GANG, GUAN CHUNFENG, et al., 2019. Overexpression of LcSABP, an orthologous gene for salicylic acid binding protein 2, enhances drought stress tolerance in transgenic tobacco [J]. *Front Plant Sci*, DOI: 10.3389/fpls.2019.00200.

MAKOTO H, SETSUKO K, 2007. Proteomic analysis of rice seedlings during cold stress [J]. *Proteomics*, 7(8): 1293-1302.

NGUYEN NH, LEE H, 2016. MYB-related transcription factors function as regulators of the circadian clock and anthocyanin biosynthesis in *Arabidopsis* [J]. *Plant Signal Behavior*, 11(3):00-00.

PAYNE CT, ZHANG F, LLOYD AM, 2000. GL3 encodes a bHLH protein that regulates trichome development in *Arabidopsis* through interaction with GL1 and TTG1 [J]. *Genetics (Print)*, 156(3):1349-1362.

REN XL, ZHAN YG, LIANG X, et al., 2015. qRT-PCR analysis of gene expression of AG and SOC1 during flower development of *Fraxinus mandshurica* Rupr. [J]. *Bull Bot Res*, 35(4):612-617. [任小龙, 詹亚光, 梁雪, 等, 2015. 水曲柳花发育过程中 AG、SOC1 基因表达的 qRT-PCR 分析 [J]. *植物研究*, 35(4):612-617.]

SIVANKALYANI V, FEYGENBERG O, DISKIN S, et al., 2016. Increased anthocyanin and flavonoids in mango fruit peel are associated with cold and pathogen resistance [J]. *Postharvest Biol Technol*, 111:132-139.

SUO JF, LIANG XE, PU L, et al., 2003. Identification of GhMYB109 encoding a R2R3 MYB transcription factor that expressed specifically in fiber initials and elongating fibers of cotton (*Gossypium hirsutum* L.) [J]. *BBA-Biomembrane S*, 2003, 1630(1).

YOO JH, PARK CY, KIM JC, et al., 2005. Direct interaction of a divergent CaM isoform and the transcription factor, MYB2, enhances salt tolerance in *Arabidopsis* [J]. *J Biol Chem*, 280(5):3697-3706.

ZHAO MR, HU WZ, YU JX, et al., 2020. Research progress on effects of methyl jasmonate on resistance, antioxidant activity and quality of fruits and vegetables [J]. *Sci Technol Food Ind*, 41(4): 328-332. [赵曼如, 胡文忠, 于皎雪, 2020, 等. 茉莉酸甲酯对果蔬抗性、抗氧化活性及品质影响的研究进展 [J]. *食品工业科技*, 41(4): 328-332.]

ZHAO YY, YANG ZE, DING YP, et al., 2019. Overexpression of an R2R3 MYB Gene, GhMYB73, increases tolerance to salt stress in transgenic *Arabidopsis* [J]. *Plant Sci*: 28-36, DOI:10.1016/j.plantsci.2019.05.021

ZHU JJ, LI YR, LIAO JX, 2013. Involvement of anthocyanins in the resistance to chilling-induced oxidative stress in *Saccharum officinarum* L. leaves [J]. *Plant Physiol Biochem*, 2013, 73(6):427-433.

ZHU Z, WANG H, WANG Y, et al., 2015. Characterization of the cis elements in the proximal promoter regions of the anthocyanin pathway genes reveals a common regulatory logic that governs pathway regulation [J]. *J Exp Bot*, 66(13): 3775.