

99, 18(2)

广西植物 Guihua 19(2): 97—104

1999年5月

1999 | 90987X | c19 | 52 |

中国茜草科资料之二

高蕴璋

Q 94.781.1

(中国科学院华南植物研究所, 广州 510650)

摘要 在编研《中国植物志》茜草科的过程中, 对龙船花属 (*Ixora*) 植物作进一步检查和整理, 共发现 6 个新分类群 *Ixora insignis*, *I. amplexicaulis*, *I. auricularis*, *I. paraopara*, *I. foonchewii*, *I. gracilis*; 新种的模式标本保存在中国科学院华南植物研究所标本馆 (IBSC)。

关键词 新分类群; 龙船花属; 茜草科

Materials for Chinensis Rubiaceae II.

Ko Wanchang

(South China Institute of Botany, Academia Sinica, Guangzhou 510650)

Abstract In this paper six new species of the genus *Ixora* (Rubiaceae) from China are described, i. e. *Ixora insignis* Chun et How ex Ko, *I. amplexicaulis* C. Y. Wu et Ko, *I. auricularis* Chun et Ko, *I. paraopara* Ko, *I. foonchewii* Ko, *I. gracilis* Ko.

Key words New species; *Ixora*; Rubiaceae

龙船花属 *Ixora* Linn.

1. 超凡龙船花 新种 图 1

Ixora insignis Chun et How ex Ko, sp. nov.

Species pedunculis elongatis circ. 14 cm longis cum *I. gracilis* Pierre et *I. flexili* Pierre ex Vietnam tantum comparabilis quae differunt foliis apice obtusis, haec insuper pedunculis secundariis longioribus patentibus, corollae lobis linearioribus obtusis.

Arbor parva, ramulis brunneis glabris, internodiis 6 cm longis. Folia chartacea oblonga vel oblongo-oblanceolata 10~14 cm longa 4~5 cm lata, apice abrupte breviterque acuminata, basi late acuta vel obtusiuscula in sicco utrinque brunnea glabra, costa ut nervi laterales utrinsecus 10~12 prope marginem arcuato-anastomosantes supra plana subtus elevata, venulis transversis subtus conspicuis; petioli 7~10 mm longi; stipulae 5~8 mm longae in aristam vagina subaequilongam excurrentes. Corymbus terminalis longe pedunculatus minute puberulus, 6~7 cm latus, pedunculo communi circ. 14 cm longo infra medium foliis rudimentariis subsessilibus ovatis circ. 4 cm longis

1997-11-19 收稿

praedito suffultus, pedunculis secundariis 1.5~1.8 cm longis, bracteis linearisubulatis 2~3 mm longis, bracteolis infra calycem ovato-triangularibus tubo calycis subaequilongis; flores in triades dispositi, pedicellis brevissimis 1.5 mm longis ut calyx minute puberulus; calyx circ. 1.8~2 mm longus, lobis oblongis obtusiuculis paululo tubo longioribus; corolla non perfecte evoluta circ. 2 cm longa, tubo gracili lobis circ. 6 mm longis obtusiusculis. Frutus ignoti.

Yunnan: Hokou, little tree, 23 May, 1953 M. Y. Siao 54 (type IBSC).

小乔木；枝褐色，无毛，节间距长 6 cm。叶纸质，长圆形或长圆状倒披针形，长 10~14 cm，宽 4~5 cm，顶端骤然收狭成短渐尖，基部阔短尖或微钝，干后两面褐色，无毛；侧脉每边 10~12 条，近边缘弯拱连接，在上面平坦，在下面凸起；横生小脉在下面明显；叶柄长 7~10 mm；托叶长 5~8 mm，顶端延伸成一芒状，延伸部分与鞘部近等长。伞房花序顶生，被微柔毛，宽 6~7 cm；总花梗长约 14 cm，中部以下有一对近无柄、卵形、长约 4 cm 的不发育小叶，第二次分枝长 1.5~1.8 cm，有线状锥形，长 2~3 mm 的苞片，小苞片生于花萼基部，卵状三角形，与萼管近等长；花着生于第三次分枝上，无梗或长 1.5 mm 与花萼同被微柔毛；萼长 1.8~2 mm，萼檐裂片长圆形，稍钝，略长于萼管；花冠未开放，长约 2 cm，冠管纤细，裂片长 6 mm，微钝。果未见。

云南：河口，小乔木，1953 年 5 月 23 日，萧敏源 54（模式）。

本种的总花梗长达 14 cm，与产自越南的 *I. gracilis* 和 *I. flexili* 作比较，后两种的叶顶端钝和短尖；总花梗的二次分枝较长，略扩展；花冠裂片钝线形而不同。

2. 抱茎龙船花 新种 图 2

Ixora amplexicaulis C. Y. Wu et Ko, sp. nov.

Proxima *I. acuminatae* Roxb. quae foliis petiolatis obovatis vel oblanceolatis basi roundatis vel cordatis, cymis sessilibus vel subsessilibus, calycis lobis tubo longioribus albis differt.

Arbor parva circ. 6 m alta glabra, ramulis teretibus in sicco castaneis. Folia tenuiter coriacea sessiles saepe elliptica 13~15 cm longa 5~6 cm lata rarius 2~2.5 cm longa 1~1.5 cm lata apice acuta




图 1 超凡龙船花 *Ixora insignis* Chun et How ex Ko

1. 花枝 (a flowering branch); 2. 未开放的花 (flower bud); 3. 花冠展开 (corolla opened up); 4. 雄蕊 (stamen); 5. 花柱和柱头 (style and stigma); 6. 子房横切面 (cross-section of ovary).

basi amplexicaulia brunnea subtus pallidiora, costa supra sulcata subtus elevata, verves lateribus utrinsecus 10~15 curvato-descendentibus prope marginem inconspicue anastomosantibus, venulis transversis supra obscuris subtus conspicuis; stipulae subulatae circ. 7 mm longae. Corymbus terminalis pedunculatus minute puberulus, pedunculo 1.5~3.5 cm longo infra basin foliis rudimentariis 2 cm longis 5~7 mm latis praedito suffultus, ramis secundariis 2.5~3 cm longis subulatis 1.5~2 mm longis bracteatis; flores in triades dispositi subsessiles vel breviter pedicelatis, pedicellis pedunculisque purpureorubis; calycis tubus cupulatus circ. 1.8~2.2 mm longus, lobis triangulatis tubo brevioribus; corolla non perfecte evolata circ. 1.3 cm longa, lobis circ. 4~5 mm longis obtusiusculis. Fructus ignoti.

Yunnan: Puwen Longshan, in thicket on a ravine, tree 6 m high, flower red. 2 Apr. 1957
Sino-Russ. Exped. 9166 (type IBSC).

小乔木，高6m，无毛；小枝圆柱形，干后褐色。叶薄革质，无柄、椭圆形，长13~15cm，宽5~6cm，稀2~2.5cm长，1~1.5cm宽，顶端短尖，基部抱茎，褐色，下面颜色稍浅；中脉在上面凹陷，在下面隆起；侧脉每边10~15条，弯拱向上，近叶缘处连结，横脉在叶面不明显，在背面显著；托叶钻形，长约7mm，伞房花序顶生；总花梗略被柔毛，长1.5~3.5cm，基部常具长约2cm、宽5~7mm、不发育的小叶；第二次分枝长2.5~3cm，具长1.5~2mm的钻形苞片；花具短梗，生于第3次分枝上，与分枝均为红色，基部有小苞片；花萼杯形，长1.8~2.2mm，萼檐裂片三角形，比萼管短；花冠未全开放，长1.3cm，裂片长4~5mm，顶端钝。果未见。

产云南，普文的龙山。生于山谷密林内或溪旁。树高6m，花红色。1957年4月2日，中苏考察队9166（模式标本）。

本种与 *I. acuminatae* Roxb. 比较相近，不同之处在于后者叶具柄，叶片倒卵形或倒披针形，基部圆形或心形，聚伞花序无梗或近无梗，萼檐裂片长于萼管。

3. 耳叶龙船花 新种 图3

Ixora auricularis Chun et How ex Ko, sp. nov.




图2 抱茎龙船花 *Ixora amplexicaulis* C. Y. Wu et Ko

1. 花枝(a flowering branch); 2. 花(flower); 3. 花蕾(flowering bud);

4. 花萼与雄蕊(calyx and pistil); 5. 雄蕊(stamen); 6. 花冠展开

示雄蕊着生位置(corolla opened up show the stamens);

7. 子房横切面(cross-section of ovary).

Affinis *I. coccinea* Linn. quae foliis multo minoribus basi rotundatis vel cordatis, inflorescentia breviore et angustiore, corollae lobis latioribus differt.

Frutex vel arbor parva circ. 6 m alta, glabra, ramulis teretibus in sicco brunneis, internodiis 6~10 cm longis. Folia sessilia vel subsessilia tenuiter chartacea saepe oblanceolata rarius oblongo-elliptica vel obovato-elliptica, 10~23 cm longa 5.5~9 cm lata, apice acute acuminata basi auriculata in sicco supra brunnea subtus pallidiora; costa supra sulcata subtus elevata, nervis lateralibus utrinsecus 10~13, supra planis subtus prominentibus intra marginem arcuato-anastomosantibus, venulis reticulatis laxis tantum subtus conspicuis; stipulae 7~18 mm longae late ovatotriangulares in aristam vagina multo longiore excurrentes. Corymbus terminalis circ. 6~15 cm latus cum pedunculus communis 3~5 cm longus; ad vel prope basin foliis rudimentariis praeditis 9~12 cm longis; bracteolae linearilanceolatae vix 1 mm longae; flores purpureo-rubri (ex Wang) laterales triadum pedicellis articulatis 2~3 mm longis instructi, centrales sessiles vel subsessiles; post anthes in calyx 2~2.5 mm longus, lobis acutis tubo paululo brevioribus; corollae tubus gracilis 4~4.5 cm longus, lobi oblanceolato-oblongi circ. 7~7.2 mm longi 3~3.5 mm lati, arcuatusculi; antherae lineares circ. 3 mm longae apiculatae. Drupae globosae 6~8 mm altae et latae.

Yunnan: Malipo alt. 1 100 m, in silvis, arbor parva 6 m alta, flores purpureo-rubri, 29 Jan. 1940, C. W. Wang 86382; Mengtze, Hokou, May 1953, Z. X. Zhou 38; ibidem, May 1953, X. Jiang 56, 91, 134, 204; ibidem, 22 Apr. 1953, K. H. Cai 272; Kinghung, July 1953, Y. S. Wang 2; nom. loc. 1956, Sino-Russ. Exped. 2347 (type SCBI).

灌木或小乔木，高约 6 m，无毛；小枝圆柱形，干后褐色；节间距离长 6~10 cm。叶无柄或近无柄，薄纸质，通常倒披针形，罕有长圆状椭圆形或倒卵状椭圆形，长 10~23 cm，宽 5.5~9 cm，顶端短渐尖，基部耳形，干后上面呈褐色，下面颜色稍淡；中脉在叶面凹陷，在叶背隆起；侧脉每边 10~13 条，网脉疏离，在叶背不明显；托叶长 7~18 mm，阔卵状三角形，顶端聚然收狭成芒尖。聚伞花序顶生，宽 6~15 cm，连同总花梗长 3~5 cm，在其基部具 9~12 cm 长的退化叶；小苞片线状




图 3 耳叶龙船花 *Ixora auricularis* C. Y. Wu et Ko

1. 花枝(a flowering branch); 2. 花(flower); 3. 4. 雄蕊(stamen);
5. 花柱(style); 6. 子房横切面(cross-section
of ovary); 7. 苞片(bract).

披针形，长约1 mm；花紫红色，第3次分枝两侧的花具梗并具关节，长2~3 mm，中央的无花梗；花萼长2~2.5 mm，萼檐裂片短尖，比萼管略短；花冠管纤细，长4~4.5 cm，裂片倒披针状长圆形，长约7~7.2 mm，宽3~3.5 mm，顶端急尖；花药线形，长约3 mm，顶部突尖。果球形，直径6~8 mm。

云南：麻栗坡，海拔1100 m，林内，小乔木，高6 m，花紫红色，1940年1月29日，王启无86382；蒙自，河口，1953年5月，周政贤38；同一地方，1953年5月，江心56、91、134、204；同上地方，1953年4月22日，蔡克华272；景洪，1953年7月，王永树2；1956年中苏考察队2347（模式）。

本种与 *Ixora coccinea* Linn. 极相似，但后者叶较小，基部圆形或心形而不是耳形；花序比较短和狭窄，花冠裂片较宽。

4. 版纳龙船花 新种 图4

Ixora paraopara Ko, sp. nov.

Species affinis *I. opacae* Br. quae differt foliis coriaceis linearilanceolatis, nervis lateralibus supra bene impressis; corollae tubo 2.5 cm longo minute puberulo.

Frutex circa 2 m alta ramulis oppositis teretibus, glabris dense lenticellatis interna 3 cm longis, nodis dilatatis. Folia papyracea oblongo-lanceolata 10~16 cm longa 3~4 cm lata, apice acuminata basi late cuneata, in sicco cinereoviridula opaca, costa media supra prominula, nervis lateralibus utrinsecus 14~16 prope marginem arcuatim anastomosantibus, venulis tertiaris obsoletis vel obscuris, petiolis brevibus supra sulcatis 1~1.5 cm longis; stipulae ovato-triangulares in aristam vagina paullo longiore excurrentes. Corymboso-cyma in paniculam terminalem, amplam 8~9 cm longam 9~10 cm latam disposita, pedunculo brevi 1~5 mm longo, bracteis linearilanceolatis vel linearis 3~5 mm longis; flores rubri inferne 2-bracteolati; calyx turbinatus 3 mm longus, tubo ut pedicello puberulo, lobis late triangularis 1 mm longis, corollae tubo glabro 1 mm longo, lobis oblongis 4 mm longis apice obtusis vel rotundis, antherae lineares 4 mm longae; stylis exserti 1.3~1.4 cm longi. Stigma 3 mm longa apice bifida. Fructus ignoti.

Yunnan: Xishuangbanna (西双版纳) April 1960, Li Yan-hui 001888. (type IBSC).

灌木，高2 m；枝对生，圆柱形，无毛，密被皮孔；节间长3 cm，节膨脹；叶纸质，长圆状披




图4 版纳龙船花 *Ixora paraopara* Ko

1. 花枝(a flowering branch); 2. 花蕾(flowering bud); 3. 4. 近闭合的花(flower); 5. 雄蕊(stamen); 6. 子房纵切面(longitudinal section of ovary); 7. 子房横切面(cross-section of ovary).

针形，长10~16 cm，宽3~4 cm，顶端渐尖，基部阔楔形，干后暗绿色；中脉在叶面隆起，侧脉每边14~16条在叶缘处弯拱连结，横脉不明显或无；叶柄短，上面具槽纹，长1~1.5 cm；托叶卵状三角形，顶部延伸成芒尖，延伸部分比鞘略长。聚伞花序排成顶生的长8~9 cm，宽9~10 cm的圆锥花序式；总花梗极短，长1~5 mm；苞片线状披针形或线形，长3~5 mm；花红色基部常常有2枚微小、线形的小苞片；萼管陀螺形，长3 mm与花梗均被柔毛，萼檐裂阔三角形，长1 mm；花冠管长1 mm，无毛，裂片矩圆形，长5 mm，顶端钝或圆形；花药线形，长4 mm；花柱伸出冠管外，长1.3~1.4 cm；柱头长3 mm，顶端2裂，果未见。

云南：西双版纳，1960年4月，李延辉001888（模式）。

本种与 *Ixora opaca* Br. 近似，但不同之处在于后者叶革质，线状披针形；侧脉在叶面上下陷；花冠管长2.5 cm被柔毛。

5. 宽昭龙船花 新种 图5

Ixora foonchewii Ko, sp. nov.

Simillima I. brachyantha Merr.,
quae differt floribus parvis 9 mm
longis, corollae tubo breviore 6 mm
longo, calycis lobis parvis tubo multo
brevioribus.

Arbor parva circ. 3 m alta, ramis
ramulisque teretibus glabris, inter-
nodiis 3~6 cm longis. Folia
chartacea elliptica 15~18 cm longa 5~7 (-9) cm lata, apice cuspidata basi late cuneata in siccitate
utrinque olivaceobrunnea, costa ut nervi laterales supra prominula subtus elevata, nervis lateralibus
utrinque 12~13, prope marginem arcuato-anastomosantes, venuis transversis supra subconspicuis
subtus conspicuis; petoli paullo crassi 1.2~1.7 cm longi; stipulae 1.2~1.4 cm longae in aristam vagina
multo longiorem excurrentes. Inflorescentia terminalis corymbusocymosa 7 cm longa 5.5 cm lata
pedunculata; pedunculo 3 cm longo saepe infra basim foliis rudimentariis praedito, foliis ovatis 2~2.5
cm longis 1~1.2 cm latis, bracteis subulatis 3~4 mm longis, bracteolis linearis, minutis; flores breviter
pedicellati in triades dispositi, pedicellis leviter crassis puberulis vix 1 mm longis; calycis tubus
cupulatus 2 mm longus, lobis triangularis 1 mm longis apice obtusis; corollae tubus 1.3 cm longus,
lobis ovatis 5 mm longis 3 mm latis apice rotundis reflexis, antheris linearibus 4 mm longis, filamentis 1
mm longis, stylis exsertis 2~3 cm longis, stigma crassa bilobata. Fructus ignoti.




图5 宽昭龙船花 *Ixora foonchewii* Ko

- 1. 花枝 (a flowering branch);
- 2. 花蕾 (flowering bud);
- 3. 花 (flower);
- 4. 雄蕊 (stamen).

Yunnan: Jinping Xian (金平县) Hei-long shan, along the road, tree 3 m high. 13 Apr. 1956, Sino-Russ. Exped. 32 (type IBSC).

小乔木，高约3m；枝和小枝圆柱形，无毛；节间距离3~6cm。叶纸质，椭圆形，长15~18cm，宽5~7(~9)cm，顶端突尖，基部阔楔形，干后两面榄褐色；中脉和侧脉在叶面稍隆起在背面隆起，侧脉每边12~13条，靠近叶缘弯拱连结，横脉在叶面不明显，在背面明显；叶柄略粗，长1.2~1.7cm；托叶长1.2~1.4cm，顶部延长成芒尖。花序顶生，聚伞花序伞房花序式排列，长7cm，宽5.5cm；总花梗长3cm，基部有不发育的小叶，卵形，长2~2.5cm，宽1~1.2cm；苞片钻形，长3~4mm；小苞片微小，线形；花具短梗，稍粗，被毛，长1mm；萼管杯形，长2mm、萼檐裂片三角形，长1mm，顶端钝；花冠管长1.3cm，裂片卵形，长5mm，宽3mm，顶端圆形，外反；花药线形，长4mm，花丝长1mm；花柱突出，长2~3cm，柱头厚，2裂。果未见。

云南：金平县，黑龙山脚路旁，树高3m。1956年4月13日中苏考察队32（模式）。

本种与 *I. brachyanthae* Merr. 极相似；不同之处在于后者花比较细小，长9mm，花冠管较短，长约6mm，萼檐裂片明显比萼管短。

6. 纤花龙船花 新种 图6

Ixora gracilis Ko, sp. nov.

Proxima *I. insigni* Chun et How ex Ko, quae foliis parum majoribus, inflorescentiis longioribus et latioribus differt.

Frutex volubilis (ecollectore), ramulis gracilibus in sicco griseo-brunneis. Folia chartacea oblonga vel obongo-elliptica 10~15(18) cm longa 3~6(8) cm lata, apice obtuse acuta basi cuneata vel late cuneata, in sicco utrinque olivaceo-brunnea; costa ut nervi laterales utrinque prominentes, nervis lateribus 7~9, intra marginem arcuato-anastomosantes, venulis transversis laxis tenuissimis subconspicuus; petioli leviter crassi supra sulcati 4~6 mm longi; stipulae circ. 7 mm longae ovatae in




图6 纤花龙船花 *Ixora gracilis* Ko

1. 花枝(a flowering branch); 2. 花(flower); 3. 雄蕊(stamen);
4. 子房纵切面(longitudinal section of ovary); 5. 子房横切面(cross-section of ovary).

aristam vagina paullo longiore excurrentes. Inflorescentiae terminales corymboso-cymosae pauciflorae pedunculatae, pedunculis ramisque puberulis, bracteis oblanceolatis, 3~5 mm longis; bractiolae minutae; flores abli breviter pedicellati, pedicellis ut calycis tubo minutissime puberulis; calyx 3~3.2 mm longus, lobis late triangularibus 1~1.2 mm longis paululo tubo brevioribus; corolla alba, tubo gracili 1.8~2 cm longo haud barbato, lobis oblongis circ. 5~6 mm longis reflexis, antheris exsertis linearibus, stylis exsertis, ramis 2.2 mm longis. Fructus ignotus.

Yunnan: Hekou, 21 June, 1967, Lau Wei-xin 326. (type IBSC).

攀援灌木；小枝纤细，干后灰褐色。叶纸质，长圆形或长圆状椭圆形，长10~15（-18）cm，宽3~6（-8）cm，顶端钝尖，基部楔形或阔楔形，干后两面榄褐色；中脉和侧脉在叶的两面均隆起；侧脉每边7~9条，近叶缘处连结，横脉疏离，不明显；叶柄略粗，上面具槽纹，长4~6mm；托叶长约7mm，卵形，顶端延长成芒尖比鞘略长。聚伞花序伞房花序式排列，顶生，疏花；总花梗和分枝均被柔毛；苞片披针形，长3~5mm；小苞片微小；花白色，具短梗，梗和萼管均被小柔毛，萼长3~3.2mm，萼檐裂片阔三角形，长1~1.2mm，比管短；花冠白色，冠管纤细，长1.8~2cm，被髯毛，裂片长圆形，长约5~6mm，外反；花药伸出冠管外，线形，花柱长2.2mm。果未见。

云南：河口，1967年6月21日，刘伟心326（模式）。

本种与 *I. insignis* Chun et How ex Ko. 极近似，不同之处在于后者的叶比较小，长10~14cm，宽4~5cm；花序比较略长和稍宽。