

## 安徽米面蓊属(檀香科)一新种

周守标, 郭新弧

(安徽师范大学生命科学学院, 安徽芜湖 241000)

**摘要:** 描述了一个新种, 即棱果米面蓊, 并提供了国产米面蓊属的分种检索表。

**关键词:** 米面蓊属; 棱果米面蓊; 新种

**中图分类号:** Q949   **文献标识码:** A   **文章编号:** 1000-3142(2004)04-0332-02

## A new species of *Buckleya* Torr. (Santalaceae) from Anhui

ZHOU Shou-biao, GUO Xin-hu

(College of Life Science, Anhui Normal University, Wuhu 241000, China)

**Abstract:** *Buckleya angulosa* S. B. Zhou et X. H. Guo is described as a new species, a key to the Chinese species in *Buckleya* Torr. is given.

**Key words:** *Buckleya*; *Buckleya angulosa* S. B. Zhou et X. H. Guo; new species

核果具纵棱这一特征, 在米面蓊属还未见有报导。我们初发现时, 以为这是一个偶然的异常现象, 经过长期的观察, 才发现这是本种一个稳定的突出特征。下面予以详细报导:

### 棱果米面蓊 新种 图 1

*Buckleya angulosa* S. B. Zhou et X. H. Guo, sp. nov., fig. 1.

Species *B. lanceolatae* (Sieb. et Zucc.) Miq. affinis, sed drupa 8 angulis longitudinalis, apice bracteis remanentes coriaceis; floris masculini disco parvo differt.

*Frutex semiparasiticus caducifolius*, c. 1 m altus, rami juvenes virelli laxe brevihispidi, veterni brunnei. Folia opposita papyracea, anguste ovatilanceolata, 3~10 cm longa, 1.5~2 cm lata, apice longe acuminata caudata, basi cuneata, margine integra, ad marginem et utrinque medium nervis brevihispida; petioli 1~2 mm longi brevispidi. Folia

ad ramorum basium elliptica vel longiobovata, 0.8~2.5 cm longa, 0.5~1.2 cm lata, apice rubeis squamis, margine aliquanto parva serrata. Flores unisexuales dioecii; inflorescentiae masculinae apicales et axillares; flores masculini c. 4 mm diam., pedicelli graciles 4 mm longi; perianthia quadrilobata, lobis triangularibus, 1.5 mm longis, 1 mm latis; stamina 4, lobis oppositis; disce parve; flores feminei non visi. Drupae obovoideae, 1~1.5 cm altae, glabrae, 8 angulis longitudinalis, apice bracteae remanentes subtiliter coriaceae, 2.5~3.5 cm longae, 0.5~1 cm latae; pedicelli graciles 1~2 cm longi, apice nodis, 1~2 cm longi. Florescentia in Maj.-Jun.; fructificatone in Sept.-Oct.

**Anhui(安徽):** Tianzhushan(天柱山), infra sylvam, alt. 550 m, 25, Sept., 2003, Zhou Shou-biao 20018(♀)(Holotypus! ANUB); ibidem, 5, Maj., 1998, Zhou Shou-biao 985521(♂).

收稿日期: 2003-12-08   修订日期: 2004-03-22

基金项目: 安徽省自然科学基金项目(00042415)

作者简介: 周守标(1963-), 男, 安徽和县人, 博士, 教授, 主要从事植物分类学的教学与研究。




图 1 棱果米面蓊

Fig. 1 *Buckleya angulosa* S. B. Zhou et X. H. Guo

1. 果枝; 2. 雄花; 3. 枝基部的叶; 4. 叶尖。

1. Fruiting branch; 2. Staminate flower; 3. Leaf of branching base; 4. Top of leaf.

*Buckleya* Torr. *Sinensis specierum clavis diagnostica*1 *Drupa nulla angulis longitudinalis*2 *Folium utrimque spiniforme hirtum; supra drupam bractae linear-i-ob lanceolatae* ..... *B. graebneriana* Diels.2 *Folium urtrimque hirtum vel laxe pubescens; supra drupam bractae lanceolatae vel oblanceolatae* ..... *B. lanceolata* Miq.1 *Drupa angulis longitudinalis* ..... *B. angulosa* S. B. Zhou et X. H. Guo

本种与米面蓊 (*Buckleya lanceolata* (Sieb. et Zucc.) Miq.) 相似, 但果具八条纵棱, 顶端宿存的苞片革质; 雄花的花盘小等特征易与前者区别。尤其是果棱, 乃为本种所独具。

半寄生落叶灌木, 高约 1 m, 嫩枝绿色, 疏被短刺毛, 老枝红褐色。叶对生, 纸质, 狭卵状披针形, 长 3~10 cm, 宽 1.5~2 cm, 先端长尾状渐尖, 基部楔形, 全缘; 叶缘和叶片两面中脉上被短刺毛。叶柄短, 长 1~2 mm, 被短刺毛, 枝基部的叶较小, 椭圆

形或长倒卵形, 长 0.8~2.5 cm, 宽 0.5~1.2 cm, 叶尖具红褐色鳞片, 边缘具微齿。花单性, 雌雄异株; 雄花序顶生或腋生; 雄花直径约 4 mm, 花梗纤细, 长 4 mm, 花被 4 裂, 裂片三角形, 长 1.5 mm, 宽 1 mm, 雄蕊 4 枚, 与花被裂片对生, 花盘小; 雌花未见。核果倒卵形, 长约 1~1.5 cm, 无毛, 具 8 条明显的纵棱; 顶端宿存叶状苞片革质, 长椭圆形, 长 2.5~3.5 cm, 宽 0.5~1 cm; 果柄细, 顶端有节, 长 1~2 cm。花期 5~6 月; 果期 9~10 月。

# 安徽米面蓊属(檀香科)一新种

作者: 周守标, 郭新弧  
作者单位: 安徽师范大学生命科学学院, 安徽, 芜湖, 241000  
刊名: 广西植物 [ISTIC PKU]  
英文刊名: GUIHAIIA  
年, 卷(期): 2004, 24(4)  
被引用次数: 1次

## 引证文献(1条)

1. 陈彬 檀香科米面蓊属植物的研究[学位论文]硕士 2005

引用本文格式: 周守标, 郭新弧 安徽米面蓊属(檀香科)一新种[期刊论文]-广西植物 2004(4)