

nulla; stamina 3, antheris atro-purpurascensibus c. 0.7 mm longis.

Guangxi (广西): Nanning (南宁), ad vastitatem crescens, 1928-10-12, R. C. Ching (秦仁昌) 7790. (Typus in PB); Guangdong (广东): Yingde (英德), 1926-10-07, K. K. Chung (钟观光) 1221; Fujian (福建): Nanjing (南靖), Hexi (和溪), Shitou shan (狮头山), alt. 400 m., 1943-11-18, Y. Ling (林镛) 4561.

科研简讯

金花茶研究简讯

一个由中国林学会、中国环境学会、中国花卉协会和日本山茶协会等八个国内外单位主办的《防城金花茶国际学术会议》将于1994年1月8日——1月11日在广西南宁召开。会议设顾问委员会。委员有花卉专家陈俊愉教授、山茶科分类专家张宏达教授、日本山茶协会副会长饭牟礼五郎先生、生态学专家王献溥研究员和《广西植物》主编李树刚研究员。植物所还有苏宗明等4人被邀与会。

金花茶自从中外花卉园艺家给她冠以茶族皇后之后,成为万众瞩目的焦点。凡有机会到野外去的研究家,刻意寻找开黄花的茶属种质,分别从分类、生态、细胞、木材解剖、栽培、用途等多方面进行研究。人员遍及北京、广州、广西、昆明等地。可谓风起云涌、沸沸扬扬。日本学者津山尚先生把胡老的 *Theopsis chrysantha* (1965) 改为 *Camellia chrysantha* (1975), 历时17年,又被广州的张宏达和叶创兴两先生发现(1991):早在1948年广州戚经文先生发表的 *Camellia nitidissima* 即为金花茶。此一发现,国内外的行家还未反应过来,昆明的闵天禄和张文驹两先生又抛出一篇系统分类研究论文(1993),声言1924年美国学者 Merrill 发表的 *Thea petelotii*, 后经英国学者 Sealy 改为 *Camellia petelotii* (1949) 的植物才是金花茶最早的命名。金花茶的拉丁正名应是 *Camellia petelotii* (Merr.) Sealy 云云。同时,闵文认为金花茶组不能成立。不少黄花的分类群也被取消或降级移位。闵文发表于今年初,广州的叶创兴博士马上撰了一文送来本刊发表。提出种种异议。这样,金花茶学术会未开,在研究界便已展开了很大的争论,在明年初召开的会议上会不会展开更多更广泛的讨论,吾人只可拭目以待了。

何况,防城的十万大山中有一个由广西区环保局建立起来的金花茶保护区,区内有一个“上岳金花茶种质园”。按惯例:种质园中代表某一种质的植物要挂一个写上拉丁学名的牌子的。到时,与会的专家们看了牌子上的学名,有没有争论呢?谁也不敢肯定。但到了那时,会场的气氛肯定是相当热烈的。

广西植物所 梁畴芬