

116-119

种子植物, 新记录植物, 湖南, 新种

### 湖南的新记录植物(一)

刘克明 刘林翰<sup>✓</sup> 李丙贵

(湖南师范大学, 长沙 410006)

Q949.409

A

**摘要** 本文报道了湖南植物分布新记录属4个, 新记录种24个, 新记录变种1个。

**关键词** 湖南; 植物分布; 新记录

### SOME NEW RECORDED TAXA FROM HUNAN PROVINCE

Liu Keming, Liu Linhan and Li Binggui

(Hunan Normal University, Changsha 410006)

**Abstract** The present paper reports 4 new records of genera, 24 new records of species and 1 new record of variety from Hunan Province. The distribution of the taxa is also presented.

**Key words:** Hunan; distribution of plants; new records

近年来, 我们在湖南植物志编写过程中, 对我馆收藏的大量湖南植物标本进行了整理, 通过标本鉴定和查阅大量文献资料, 发现一些在有关湖南植物文献资料中未曾记录过的植物。在目前已鉴定的标本中, 确认有新记录属4个, 新记录种24个, 新记录变种1个, 现予报道。本文引证的部分标本承王文采先生、程用谦先生鉴定, 所有标本均藏湖南师范大学生物系植物标本馆(HNNU)。

#### 1 蓼科 Polygonaceae

##### 1.1 疏忽蓼

*Polygonum praetermissum* Hk. f. Fl. Brit. Ind. 5:47, 1886. 湖北植物志1: 239. 1976. 产地: 湖南: 江华县, 香草乡, 海拔800米, 生田边湿地, 1992年7月25日, 刘克明 777204 \*。分布: 广西、云南、浙江、湖北。

#### 2 毛茛科 Ranunculaceae

##### 2.1 大麻叶乌头

*Aconitum cannabifolium* Franch. ex Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 51:503. 1904; 中国植物志27: 254. 1979. 产地: 湖南: 石门县, 南坪乡, 海拔1400米, 1981年8月13日, 刘林翰 17734 \*。分布: 四川、湖北、陕西。

\* 湖南首次记录。

## 2.2 川鄂乌头

*Aconitum henryi* Pritz. in Bot. Jahrb. 29: 329. 1900; 中国植物志27: 254. 1979.  
产地: 湖南: 石门县, 壶瓶山, 大黄连坪, 海拔1400米, 1981年8月9日, 刘林翰18056\*。  
分布: 四川、湖北。

## 2.3 长齿乌头

*Aconitum lonchodontum* Hand. -Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 122. 1939; 中国植物志27: 227. 1979. 产地: 湖南: 石门县, 壶瓶山, 海拔1400米, 生山坡草甸, 1981年8月15日, 刘林翰 17797\*。 分布: 湖北西部。

## 2.4 甘肃楼斗菜

*Aquifegia oxysepala* var. *kansuensis* Brühl in Journ. As. Soc. Beng. 61: 285. 1892; 中国植物志 27: 498. 1979. 产地: 湖南: 石门县, 壶瓶山, 海拔1850米, 生山地草丛, 1981年8月15日, 刘林翰 17825\*。 分布: 云南、四川、湖北、陕西、甘肃、青海、宁夏。

## 2.5 升 麻

*Cimicifuga foetida* L. Syst. Nat. ed. 12. 659. 1767; 中国植物志27: 101. 1979.  
产地: 湖南: 石门县, 南坪公社, 海拔1420米, 生山谷林下, 1981年8月7日, 刘林翰 17521\*。 分布: 西藏、云南、四川、青海、甘肃、陕西、河南、山西、湖北。

## 2.6 金佛铁线莲

*Clematis gratopsis* W. T. Wang, 植物分类学报 6 (4): 385. 1957; 中国植物志28: 184. 1980. 产地: 湖南: 石门县, 南坪乡, 海拔750米, 生山谷疏林下, 1981年11月6日, 刘林翰 17908。 分布: 四川、湖北、甘肃、陕西。

## 2.7 须蕊铁线莲

*Clematis pogonandra* Maxim in Act. Hort. Petrop. 11: 8. 1890; 中国植物志28: 125. 1980. 产地: 湖南: 石门县, 壶瓶山, 海拔1900米, 1981年8月15日, 刘林翰17800\*。  
分布: 四川、甘肃、陕西及湖北。

## 2.8 人字果

*Dichocarpum sutchuenense* (Franch.) W. T. Wang et Hsiao, 植物分类学报 9: 328. 1964; 中国植物志27: 479. 1979. 产地: 湖南: 桑植县, 芭茅溪小庄坪, 海拔1530米, 生山谷林下湿地, 1978年5月19日, 刘林翰17329\*。 分布: 云南、四川、湖北、浙江。

## 3 槭树科 Aceraceae

## 3.1 疏花槭

*Acer laxiflorum* Pax in Engl. Pflanzenreich, 8: 36. 1902; 中国植物志46: 225. 1981. 产地: 湖南: 宜章县, 莽山泽子坪, 海拔1350米, 生疏林路边, 1993年6月30日, 刘林翰776245\*。 分布: 四川、云南。

## 3.2 天目槭

*Acer sinopurpurascens* Cheng in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China, Bot. Ser. 6: 62. 1931; 中国植物志46: 249. 1981. 产地: 湖南: 桑植县, 芭茅溪天平山小庄坪, 海拔1700米, 1975年6月24日, 李丙贵、万绍宾750039\*。 分布: 浙江、江西。

**4 秋海棠科 Begoniaceae****4.1 紫背天葵**

*Begonia fimbriatipulata* Hance in Journ. Bot. 21: 202, 1883. 中国高等植物图鉴 2: 941. 1972. 产地: 湖南: 宜章县, 莽山, 金竹坑, 海拔1300米, 生疏林路边湿地, 1993年6月27日, 刘林翰776144\*。 分布: 浙江、江西、福建、广东、广西、云南、四川。

**5 鹿蹄草科 Pyrolaceae****5.1 水晶兰**

*Monotropa uniflora* L. Sp. Pl. 387, 1753. 中国高等植物图鉴 3: 22, 1974. 产地: 湖南: 城步县, 蓬洞老山, 海拔1500米, 生荒山草丛中, 1982年9月30日, 曹铁如821204\*。 分布: 在我国分布于西藏、西南、陕西、河北、东北、浙江等省区。属和种在湖南为首次记录。

**6 茄科 Solanaceae****6.1 天茄子**

*Atropanthe sinensis* (Hemsl.) Pascher in Österr. Bot. Zietsch. 59: 329, 1909; 中国植物志 67(1): 27, 1978. —— *Scopolia sinensis* Hemsl. 中国高等植物图鉴 3: 710, 1974. 产地: 湖南: 石门县, 壶瓶山, 海拔1360米, 生沟边湿地, 1992年7月4日, 刘克明777176\*。 分布: 湖北、四川、贵州及云南。属和种在湖南为首次记录。

**7 车前科 Plantaginaceae****7.1 披针叶车前**

*Plantago lanceolata* L. Sp. Pl. 113, 1753. 中国高等植物图鉴 4: 182, 1975. 产地: 湖南: 城步县, 南山牧场, 生于草地, 1988年6月, 杨保民058\*。 分布: 辽宁、山东、浙江、江西、台湾。

**8 忍冬科 Caprifoliaceae****8.1 盘叶忍冬**

*Lonicera tragophylla* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 367, 1888; 中国植物志 72: 259, 1988. 产地: 湖南: 石门县, 南坪乡, 五一村, 海拔1400米, 1981年8月8日, 刘林翰 17599\*。 分布: 华北, 长江下游、浙江、贵州。

**9 菊科 Compositae****9.1 长穗兔儿风**

*Ainsliaea henryi* Diels in Engl. Jahrb. 29: 628, 1901. 中国高等植物图鉴 4: 661, 1975. 产地: 湖南: 宜章县, 莽山牛背脊, 海拔1750米, 生山坡林下湿地, 1957年7月21日, 刘林翰 801\*, 同地, 1964年8月16日黄茂先 112109. 分布: 湖北、四川、云南、广西。

**9.2 小花金挖耳**

*Carpesium minus* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 431, 1888; 中国植物志 75: 306. 产地: 湖南: 湘西, 海拔750米, 杨保民 2052\*。 分布: 云南、四川、湖北及江西。

**9.3 灰 药**

*Cirsium griseum* Lévl. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 12: 284. 1913; 植物分类学报 22(5): 392. 1984; 中国植物志 78(1): 93. 1987. — *C. botryodes* Petrak. 中国高等植物图鉴 4: 613. 1975. 产地: 湖南: 湘西凤凰县, 腊尔山, 海拔600米, 1957年9月2日, 杨一光 3056\*. 分布: 贵州、四川及云南。

#### 9.4 牛膝菊

*Galinsoga parviflora* Cav. Ic. et Descr. Pl. 3: 41. 1795; 中国植物志 75: 384. 1979. 产地: 湖南: 石门县, 壶瓶山, 海拔350米, 生路边湿地, 1992年6月28日, 刘克明 777001\*; 同地, 1992年7月3日, 刘克明 777156. 分布: 四川、云南、贵州、西藏等省。原产南美洲, 在我国归化。

#### 9.5 裸柱菊

*Solidia anthemifolia* (Juss.) R. Br. in Trans. Linn. Soc. 12: 102. 1817; 中国植物志 76(1): 135. 1983. 产地: 湖南: 衡阳, 二七二工厂铀矿附近, 海拔340米, 生于荒地, 1982年9月, 赵敏 068\*. 分布: 原产南美洲。大洋洲也有。我国广东、台湾、福建、江西有分布。属和种在湖南为首次记录。

#### 9.6 金纽扣

*Spilanthes paniculata* Wall. Ex DC., Prodr. 5: 125. 1836; 中国植物志 75: 359. 1979. 产地: 湖南: 江华县, 大坪乡, 海拔300米, 生田野路边, 1975年11月21日, 李丙贵 5434\*. 分布: 在我国分布于云南、广东、广西及台湾。

### 10 百合科 Liliaceae

#### 10.1 长茎沿阶草

*Ophiopogon chingii* Wang et Tang, 静生汇报 7: 282. 1937; 中国植物志 15: 146. 1978. 产地: 湖南: 永顺县, 猛洞河, 猴儿跳, 海拔310米, 生山谷林下石缝中, 1988年7月10日, 刘林翰 20753\*. 分布: 广东、广西、云南、贵州、四川。

#### 10.2 岩菖蒲

*Tofieldia tibetica* Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris Sér. 2, 10: 95. 1888; 中国植物志 14: 10. 1980. 产地: 湖南: 湘西大庸, 张家界腰子寨, 海拔1000米, 生于疏林下岩石上, 1988年7月19日, 刘林翰 20957. 分布: 四川、贵州及云南。属和种在湖南为首次记录。