

DOI: 10.11931/guihaia.gxzw201808008

引文格式: 杨珂, 周延清, 段红英, 等. 地黄 SCoT 分子标记体系的建立和指纹图谱的构建 [J]. 广西植物, 2019, 39(5): 608-614.
YANG K, ZHOU YQ, DUAN HY, et al. SCoT molecular marker system and fingerprint in *Rehmannia glutinosa* [J]. *Guihaia*, 2019, 39(5): 608-614.

地黄 SCoT 分子标记体系的建立和指纹图谱的构建

杨珂¹, 周延清^{1,2,3*}, 段红英¹, 郭萌萌¹

(1. 河南师范大学 生命科学学院, 河南 新乡 453007; 2. 资源微生物与功能分子河南省高校重点实验室培育基地 河南师范大学, 河南 新乡 453007; 3. 地道中药材保育及利用河南省高校工程技术研究中心 河南师范大学, 河南 新乡 453007)

摘要: 该研究采用 $L_{25}(5^6)$ 正交设计和单因素两种方法, 对影响地黄 SCoT-PCR 反应的 5 个因素 (模板 DNA 浓度, 引物浓度, ddH₂O 和 Mix 的用量以及退火温度) 进行了优化。结果表明: 优化后的反应体系总体积为 25 μ L, 含有 8 μ L ddH₂O, 1 μ L 模板 DNA (80 ng \cdot μ L⁻¹), 1 μ L 引物 (8 μ mol \cdot L⁻¹) 和 15 μ L Mix, 退火温度为 45 $^{\circ}$ C。运用 30 份地黄种质材料, 对优化的 SCoT-PCR 正交体系进行多次重复验证, 获得了多态性丰富、条带清晰的扩增图谱, 证明该反应体系稳定可靠。利用该体系对 32 条 SCoT 引物进行两次筛选, 得到 14 个扩增产物清晰、重复性好且多态性条带相对较高的引物。利用 SCoT4 等 5 条引物构建了上述地黄 2 个种共 30 份种质的 SCoT 指纹图谱。利用这 5 个 SCoT 引物指纹图谱可将 7 个地黄常用栽培品种区分开。这表明 SCoT 分子标记体系适用于地黄主要品种亲缘关系及遗传多样性的研究, 所构建的指纹图谱也为地黄常见的 7 个栽培品种的区分提供参考依据。

关键词: 目标起始密码子多态性 (SCoT), 单因素试验, 正交设计, 引物筛选, 品种鉴定

中图分类号: Q949.9, O413 文献标识码: A 文章编号: 1000-3142(2019)05-0608-07

SCoT molecular marker system and fingerprint in *Rehmannia glutinosa*

YANG Ke¹, ZHOU Yanqing^{1,2,3*}, DUAN Hongying¹, GUO Mengmeng¹

(1. College of Life Sciences, Henan Normal University, Xinxiang 453007, Henan, China; 2. Key Laboratory for Microorganisms and Functional Molecules, Henan Normal University, Xinxiang 453007, Henan, China; 3. Engineering Technology Research Center of Nursing and Utilization of Genuine Chinese Crude Drugs, Henan Normal University, Xinxiang 453007, Henan, China)

Abstract: We used $L_{25}(5^6)$ orthogonal design and single factor method to optimize the five factors (template DNA concentration, primer concentration, ddH₂O, Mix amount and annealing temperature) that affect the SCoT-PCR reaction of *Rehmannia glutinosa*. The results were as follows: The reaction system was a total volume of 25 μ L containing 8 μ L of

收稿日期: 2018-10-09

基金项目: 河南省自然科学基金 (182300410018); 国家 NSFC-河南人才培养联合基金 (U1304304); 河南省教育厅科学技术研究重点项目 (14B180028); 河南师范大学 2016 年度国家级项目培育基金 (2016PL18); 大学生创新创业训练计划项目 (0424, 0438) [Supported by the Henan Natural Science Foundation (182300410018); the National NSFC-Henan Talent Training Joint Fund (U1304304); Henan Provincial Department of Education Science and Technology Research Key Program (14B180028); Henan Normal University 2016 National Program Cultivation Fund (2016PL18); Undergraduate Innovation and Entrepreneurship Training Program (0424, 0438)]。

作者简介: 杨珂 (1994-), 女, 河南南阳人, 硕士研究生, 研究方向为微生物遗传, (E-mail) ykelucky@163.com。

* 通信作者: 周延清, 博士, 教授, 主要从事遗传学研究, (E-mail) yqzhou@htu.cn。

ddH₂O, 1 μL of template DNA (80 ng · μL⁻¹), 1 μL of primer (8 μmol · L⁻¹) and 15 μL of Mix, and an annealing temperature of 45 °C. The optimized SCoT-PCR orthogonal system was repeatedly verified by using 30 parts of *Rehmannia* germplasm materials, and the amplified spectrum with rich polymorphism and clear bands was obtained, which proves that the reaction system is stable and reliable. Using this system, 32 SCoT primers were screened twice, and 14 primers with clear, reproducible and relatively high polymorphic bands were obtained. Finally, SCoT fingerprints of 30 species of the above two species of *Rehmannia* were constructed by using five primers such as SCoT4. Using these five SCoT primer fingerprints, seven common cultivars of *Rehmannia glutinosa* can be distinguished. The study indicates that the SCoT molecular marker system is suitable for the study of genetic relationship and genetic diversity of the main varieties of *Rehmannia glutinosa*. The fingerprints constructed also provide reference for the differentiation of seven cultivars commonly found in *Rehmannia glutinosa*.

Key words: target initiation codon polymorphism (SCoT), single factor test, orthogonal design, primer screening, variety identification

地黄(*Rehmannia glutinosa*)是玄参科地黄属多年生草本植物,包括天目地黄、裂叶地黄、高地黄、湖北地黄、茄叶地黄与地黄 6 个种,分布于中国、日本和韩国等国家。在我国,地黄主要分布于河南、山西、辽宁、山东、陕西和安徽等地。地黄根作为药材和食材,具有重要的经济价值。因此,地黄备受人们青睐,广为研究。

就地黄 DNA 分子标记研究而言,迄今已有 RAPD、ISSR、SRAP、SCAR、ITS、AFLP、叶绿体 DNA 非编码区片段和 EST-SSR 分子标记应用于地黄遗传多样性评价、分类、鉴定、指纹图谱、居群遗传关系、结构及诊断茎尖快速繁殖地黄品种和 F1 代杂种(周延清等,2015;王婉坤,2016;夏至等,2016)、种的鉴定等方面(冯法节等,2015;Liu et al., 2015)。但是,这些标记各有缺点。譬如,RAPD 标记、AFLP 标记和 SSR 标记依次具有不稳定性、费时与昂贵和难以开发等缺点,所以,需要开发新地黄分子标记。目标起始密码子多态性分子标记(start codon targeted polymorphism, SCoT)标记是一种基于单引物扩增反应的新型目的基因分子标记,是根据植物基因 ATG 起始密码子侧翼保守区域设计单引物,对基因组中 ATG 两侧的区域进行扩增,产生偏向候选功能基因区显性多态性标记,具有能获得与性状联系紧密的目的基因、能对性状进行跟踪、操作简单、重复性好、多态性丰富与引物通用性好等优点,已被广泛应用于硬粒小麦遗传多样性分析(Guo et al., 2016)、间接器官发生

途径再生火索麻植株的遗传纯合率(Mariappan et al., 2016)、基因差异表达和分子遗传连锁图谱构建等方面(龙治坚等,2015)。

迄今,SCoT 标记技术尚未见地黄应用方面的报道,从分子角度探讨地黄遗传多样性和亲缘关系的研究也相对较少(陈大霞等,2012)。因此,本研究以开发地黄新分子标记为目的,以地黄为材料,构建与优化地黄 SCoT-PCR 体系,并筛选合适引物,对 30 份种质进行了 SCoT 指纹图谱的构建,为地黄遗传多样性分析和品种鉴定等研究奠定基础,也为地黄常见的 7 个栽培品种红薯王、抗育 831、北京 3 号、北京 2 号、金状元、金九和温 85-5 的区分提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 材料

所用地黄种质收集于河南 4 个市县、山东 2 个区县和上海华东师范大学,包括裂叶地黄(*Rehmannia piasezkii*)和地黄(*Rehmannia glutinosa*)这 2 个种,共 30 份种质。具体如下:1.灵宝野生;2.上作 1;3.山西北相;4.金线吊鱼;5.密县野生;6.郭里毛;7.红薯王;8.组培 9302;9.抗育 831;10.古贤地黄;11.皇后杂;12.北京 3 号;13.灵宝野生;14.三块;15.方庄地黄;16.温怀地黄;17.北京 2 号;18.金状元;19.范山地黄;20.狮子头;21.上作 2;22.张寺 961;23.金九;24.文昌地黄;25.泰山地黄;26.舞阳

地黄; 27. 野生地黄; 28. 裂叶地黄; 29. 温 85-5; 30. 卫辉地黄。其中, 1-23 号取自温县农科所, 24 号取自济南文昌山, 25 号取自济南泰安泰山, 26 号取自漯河舞阳县, 27 号取自灵宝县胡家原村, 28 号取自华东师范大学, 29 号取自河南师范大学, 30 号取自卫辉市比干庙。2016 年 5 月由研究生王婉坤采集的新鲜幼嫩叶子, 每个产地共采集三株作为重复, 经硅胶快速干燥后保存于 $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$ 冰箱备用。均经过河南师范大学段红英教授鉴定和王婉坤研究生 ITS 测序与 NCBI 比对, 确定为裂叶地黄或地黄种质(王婉坤, 2016)。试验用的 Taq MasterMix 由北京康为世纪生物科技有限公司合成。从文献(陈大霞等, 2012; 李丕睿等, 2013; 蒋雅琴等, 2014) 查选的 32 个单引物序列, 由北京三博远志生物公司合成, 命名为 SCoT1-SCoT32。

1.2 DNA 的提取与检测

取新鲜地黄叶片, 根据改良的 CTBA 提取叶片 DNA, 并用 1% 琼脂糖凝胶电泳检测 DNA 完整性, 并用紫外分光光度计测定其浓度和纯度, 将样品按所需浓度稀释, 置于 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 条件下保存备用。

1.3 基础 SCoT-PCR 体系的建立与目标引物的筛选

根据文献(徐林涛, 2015; Guo et al., 2016; Mahjbi et al., 2015) 初步建立基础的地黄 SCoT-PCR 反应体系, 对 32 条引物进行初次的筛选。SCoT-PCR 反应体系为 $20\text{ }\mu\text{L}$, 包含 $8\text{ }\mu\text{L}$ ddH₂O、 $1\text{ }\mu\text{L}$ 模板 DNA ($80\text{ ng}\cdot\mu\text{L}^{-1}$)、 $1\text{ }\mu\text{L}$ 引物 ($8\text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)、 $10\text{ }\mu\text{L}$ Mix。扩增程序: $94\text{ }^{\circ}\text{C}$ 预变性 4 min; $94\text{ }^{\circ}\text{C}$ 变性 1 min, $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 退火 1 min, $72\text{ }^{\circ}\text{C}$ 延伸 2 min, 36 个循环; $72\text{ }^{\circ}\text{C}$ 延伸 5 min; $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 保存。采用 1% 琼脂糖凝胶电泳检测 PCR 扩增产物, 拍照分析。

1.4 SCoT-PCR 的正交试验设计

温 85-5 为地黄最常见的栽培品种。选取温 85-5 品种 DNA 为模板, 以 1.3 中筛选的 SCoT15 为引物, 针对模板 DNA 浓度、引物浓度、ddH₂O 体积、PCR 反应体系中 Mix 的用量和退火温度 5 种因素设置 5 个不同水平(表 1)。采用 $L_{25}(5^6)$ 正交试验设计对基础 SCoT-PCR 进行体系优化, 2 次重复。PCR 扩增反应在梯度 PCR 仪 Tgradient 上进行, 扩增程序: $94\text{ }^{\circ}\text{C}$ 预变性 4 min; $94\text{ }^{\circ}\text{C}$ 变性 1 min, 退火温度的设定依据正交表 1 min, $72\text{ }^{\circ}\text{C}$ 延伸 2 min, 36 个

表 1 地黄 SCoT-PCR 反应体系 $L_{25}(5^6)$ 正交试验设计
Table 1 *Rehmannia glutinosa* SCoT-PCR reaction system $L_{25}(5^6)$ orthogonal test design

处理 Treatment	ddH ₂ O (μL)	模板 DNA 用量 Template DNA ($\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)	引物 Primer ($\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)	Mix (μL)	退火温度 Annealing temperature ($^{\circ}\text{C}$)
1	7	50	3.5	9.0	45
2	7	65	5.0	10.5	48
3	7	80	6.5	12.0	51
4	7	95	8.0	13.5	54
5	7	110	9.5	15.0	60
6	8.5	50	5.0	12.0	54
7	8.5	65	6.5	13.5	60
8	8.5	80	8.0	15.0	45
9	8.5	95	9.5	9.0	48
10	8.5	110	3.5	10.0	51
11	10	50	6.5	15.0	48
12	10	65	8.0	9.0	51
13	10	80	9.5	10.5	54
14	10	95	3.5	12.0	60
15	10	110	5.0	13.5	45
16	11.5	50	8.0	10.5	60
17	11.5	65	9.5	12.0	45
18	11.5	80	3.5	13.5	48
19	11.5	95	5.0	15.0	51
20	11.5	110	6.5	9.0	54
21	13.0	50	9.5	13.5	51
22	13.0	65	3.5	15.0	54
23	13.0	80	5.0	9.0	60
24	13.0	95	6.5	10.5	45
25	13.0	110	8.0	12.0	48

循环; $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 保存。扩增结束后, 吸取扩增产物 $8\sim 10\text{ }\mu\text{L}$ 进行 1% 琼脂糖凝胶电泳, 电极缓冲液为 $1\times\text{TAE}$, 在 Gel DoctmEZ 凝胶成像仪拍照。

1.5 退火温度优化

退火温度是影响 PCR 特异性的的重要因素。根据正交试验筛选出的最有体系设计单因素试验, 对退火温度再次进行梯度优化。试验设置了 5 个温度梯度: 45.0 、 47.0 、 51.3 、 53.3 、 $55.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。除退火温度不同外, 反应程序与筛选出的正交试验体系相同。

1.6 正交试验最优体系的验证

用 1.3 中筛选的 14 条引物和 1.5 中优化后的正交体系,对 30 份地黄种质 DNA 模板进行扩增,用 1% 琼脂糖凝胶电泳检测扩增产物,验证该体系的稳定性、通用性和重复性,同时对 14 条引物进行第二次筛选。对所得的 SCoT 谱带保存并进行数据分析。

1.7 数据处理

数据用人工读带的方法,根据 SCoT-PCR 扩增产物在凝胶电泳上的相对位置,依据分子量从大到小的顺序读带,对电泳图谱上清晰且可辨认的条带记为 1,无条带记为 0,缺失记为 9,模糊不清的不予记录,建立 30 份地黄种质的 SCoT 指纹图谱。

2 结果与分析


2.1 地黄 DNA 质量和浓度的检测

用 1% 琼脂糖凝胶电泳检测 DNA 完整性,检测结果显示所得的 DNA 条带清晰完整,无拖尾和蛋白质污染。取 1 μL 提取的 DNA,以 ddH₂O 作为

基准,用微量分光光度计测定其浓度和纯度,OD₂₆₀/OD₂₈₀ 均在 1.8~2.0 之间,说明所提取的地黄 DNA 较纯净,无杂质污染,可进行 PCR 扩增试验。

2.2 基础 SCoT-PCR 体系建立和筛选引物

利用基础体系与扩增程序,以温 85-5、金九、金状元、红薯王等地黄常见栽培种质的 DNA 模板,对 32 条 SCoT 引物进行 SCoT-PCR 筛选(图 1)。初次获得扩增产物清晰、重复性好且多态性条带相对较高的 14 条引物 SCoT4: ACCATGGCTACCACCGCG; SCoT5: ACGACATGGCGACCGCGA; SCoT11: CAACAATGGCTACCACGT; SCoT14: AAGCAATGGCTACCACCA; SCoT15: ACGACATGGCGACCATCG; SCoT16: ACGACATGGCGACCGCG; SCoT19: ACCATGGCTACCACCGGC; SCoT21: GCAACAATGGCTACCACC; SCoT23: ACCATGGCTACCACCGCA; SCoT25: CCATGGCTACCACCGGCC; SCoT26: CCATGGCTACCACCGGCG; SCoT27: CCATGGCTACCACCGCCT; SCoT28: CCATGGCTACCACCGCAG; SCoT29: ACGACATGGCGACCAACG,并正式用于 PCR 扩增。



注: M. D 5000 marker; 泳道 1~32. 依次代表引物 SCoT1-SCoT32。

Note: M. D 5000 marker; Lanes 1~32. Primers SCoT1-SCoT32.

图 1 温 85-5 对 32 条引物 SCoT1-SCoT32 的初次筛选

Fig. 1 Primary screening of 32 primers SCoT1-SCoT32


2.3 正交试验的验证

从正交试验扩增结果可以看出,25 个处理组合中有 18 个产生谱带,其中 10 号、14 号、16 号、18 号、20 号、22 号和 23 号处理组合没有扩增出产物,5 号、6 号、7 号和 19 号扩增产物极少,8 号和 9 号处理组合扩增谱带清晰,易于辨认,呈现多态性(图 2)。综合各个条带的直观分析,最终确定地

黄 SCoT-PCR 的最佳反应体系为 ddH₂O 8 μL ,模板 DNA 用量 80 $\text{ng} \cdot \mu\text{L}^{-1}$,引物 8 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$,Mix15 μL ,退火温度 45 $^{\circ}\text{C}$,总体积 25 μL 。

2.4 退火温度优化

在研究的 5 个退火温度(图 3)中,45.0 $^{\circ}\text{C}$ 扩增的条带背景较强,条带易于辨认且特异性强;47.0 $^{\circ}\text{C}$ 和 55.0 $^{\circ}\text{C}$ 扩增的条带少且背景较弱;51.3




注: M. D 5000 marker; 泳道 1-25. 从左到右依次为正交表 $L_{25}(5^6)$ 个处理。

Note: M. D 5000 marker; Lane 1-25. From left to right, orthogonal table $L_{25}(5^6)$ processing.

图 2 正交设计电泳结果

Fig. 2 Orthogonal design electrophoresis results



注: M. D 5000 marker; 泳道 1-5. 从左到右依次为 5 个温度梯度: 45.0、47.0、51.3、53.3、55.0 °C。

Note: M. D 5000 marker; Lanes 1-5. From left to right are five temperature gradients: 45.0, 47.0, 51.3, 53.3, 55.0 °C.

图 3 退火温度对地黄 SCoT-PCR 反应的影响

Fig. 3 Effects of annealing temperature on SCoT-PCR reaction of *Rehmannia glutinosa*

℃和 53.3 °C 随着退火温度的升高,扩增条带数目增加,背景增强,但当退温度上升到 55.0 °C 时,背景又变弱。因此,以条带扩增清晰、呈现多态性为依据,确定本试验的最佳退火温度为 45.0 °C。

2.5 地黄最适反应体系的验证

用初次筛选的 14 条引物,对 30 份地黄种质 DNA 模板进行 SCoT-PCR 分析,将产物进行琼脂糖凝胶电泳检测。除 SCoT21 和 SCoT25 外,所用引物均能在供试材料中扩增出条带清晰、亮度适中、多态性高的条带。如 SCoT15 在 30 份地黄材料中的扩增谱带清晰、易于辨认、呈现多态性(图

4)。这说明建立和优化的 SCoT 分子标记反应体系适用于地黄基因组 DNA 的遗传多样性等后续研究。

2.6 SCoT 引物扩增分析

通过对 32 条 SCoT 引物的两次筛选,得到 14 个扩增产物清晰、重复性好且多态性条带相对较高的引物。利用筛选的 14 条 SCoT 引物对 30 份地黄种质资源进行扩增分析,研究结果表明:(1) 14 条 SCoT 引物对 30 份地黄材料共扩增出 103 个位点,其中多态性位点有 96 个,多态率达 94.2%;(2) 30 份材料的遗传相似系数在 0.471 9~0.922 3 之间,

3 讨论

本研究筛选的 14 条 SCoT 引物在 30 份地黄资源中具有很高的多态性,平均多态率达到 94.2%,其引物多态性效果比一些报道的结果好。如李丕睿等(2013)对 18 份菊花材料进行多样性研究发现,12 条 SCoT 引物的平均多态率为 90.4%;在蒋雅琴等(2014)对 81 份丝瓜品种的研究中,10 条引物的多态率为 87.57%。利用这些引物能在部分栽培品种中扩增出特异性条带,这些特异性条带是否与特定性状有关,还需要进一步研究证明。

本研究以开发地黄新分子标记为目的,克服上述 SCoT-PCR 技术的不足,建立并优化出适宜的地黄 SCoT-PCR 反应体系,即总体积 25 μL , 包含 ddH_2O 8 μL , 模板 DNA 用量 80 $\text{ng} \cdot \mu\text{L}^{-1}$, 引物 8 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, Mix 15 μL , 退火温度 45 $^\circ\text{C}$ 。该 SCoT-PCR 体系已在地黄栽培种、地黄属的 2 个不同种之间、农家种与野生种上进行了通用性和稳定性验证,都得到了特异性丰富的谱带,表明其适于地黄属种质的指纹图谱构建和鉴定及遗传多样性分析等,也为其 SCAR 标记开发等后续研究奠定了基础。

参考文献:

- CHEN DX, LI LY, PENG R, et al., 2009. SRAP study on genetic relationship and genetic diversity of three cultivation types of *Scrophularia sinensis* [J]. *Chin J Mat Med*, 34(2): 138-142. [陈大霞, 李隆云, 彭锐, 等, 2009. 玄参 3 种栽培类型遗传关系和遗传多样性的 SRAP 研究 [J]. 中国中药杂志, 34(2): 138-142.]
- FENG FJ, LI MJ, GU L, et al., 2015. Development of EST-SSR markers and establishment of amplification system for *Rehmannia glutinosa* [J]. *Guangdong Agric Sci*, 42(10): 120-126. [冯法节, 李明杰, 古力, 等, 2015. 地黄 EST-SSR 标记的开发及扩增体系的建立 [J]. 广东农业科学, 42(10): 120-126.]
- GUO J, YU X, YIN H, et al., 2016. Phylogenetic relationships of *Thinopyrum* and *Triticum* species revealed by SCoT and CDDP markers [J]. *Plant Syst Evol*, 302(9): 1301-1309.
- JIANG YQ, LI Y, LI WJ, et al., 2014. Application of SCoT markers on genetic diversity analysis of *Loofah* Mill. [J]. *J S Agric*, 45(12): 2117-2122. [蒋雅琴, 黎炎, 李文嘉, 等, 2014. SCoT 分子标记技术在丝瓜上的应用 [J]. 南方农业学报, 45(12): 2117-2122.]
- LI PR, JIANG JF, CHEN SM, et al., 2013. Application of SCoT molecular marker technology in genetic diversity analysis of *Chrysanthemum* [J]. *J Hortic*, 40(10): 2015-2025. [李丕睿, 蒋甲福, 陈素梅, 等, 2013. 菊属植物 SCoT 分子标记技术在遗传多样性分析中的应用 [J]. 园艺学报, 40(10): 2015-2025.]
- LIU CY, YUAN C, LI XT, et al., 2015. Development of microsatellites from *Rehmannia glutinosa* transcriptome and evaluation of genetic diversity among *Rehmannia* species [J]. *Biochem Syst Ecol*, 59: 177-182.
- LONG ZJ, FAN LZ, XU G, et al., 2015. Progress in the application of SCoT molecular markers in plant research [J]. *J Plant Gen Resour*, 16(2): 336-343. [龙治坚, 范理璋, 徐刚, 等, 2015. SCoT 分子标记在植物研究中的应用进展 [J]. 植物遗传资源学报, 16(2): 336-343.]
- MAHJBI A, BARAKET G, OUESLATI A, et al., 2015. Start Codon Targeted (SCoT) markers provide new insights into the genetic diversity analysis and characterization of Tunisian *Citrus* species [J]. *Biochem Syst Ecol*, 61: 390-398.
- MARIAPPAN M, THIRUPATHI SK, MANDALI VR, 2016. Organogenesis and evaluation of genetic homogeneity through SCoT and ISSR markers in *Helicteres isora* L., a medicinally important tree [J]. *Safr J Bot*, 106: 204-210.
- WANG WS, 2016. Screening and identification of DNA barcode sequences of *Rehmannia glutinosa* [D]. Xinxiang: Henan Normal University. [王婉坤, 2016. 地黄 DNA 条形码序列的筛选与鉴定研究 [D]. 新乡: 河南师范大学.]
- XU LT, 2015. Identification of wheat-intermediate ryegrass germplasm line [D]. Tai'an: Shandong Agricultural University. [徐林涛, 2015. 小麦—中间偃麦草种质系的鉴定 [D]. 泰安: 山东农业大学.]
- XIA Z, WANG LJ, HUANG Y, et al., 2016. Identification of DNA barcodes of *Rehmannia* and the origin of *Rehmannia* cultivation [J]. *Chin Trad Herb Drugs*, 47(4): 648-654. [夏至, 王璐静, 黄勇, 等, 2016. 地黄属植物 DNA 条形码鉴定及地黄栽培起源研究 [J]. 中草药, 47(4): 648-654.]
- ZHOU YQ, YAO HL, ZHOU CE, et al., 2010. Research progress of *Rehmannia* breeding [J]. *Guihaia*, 30(3): 373-376. [周延清, 姚焕灵, 周春娥, 等, 2010. 地黄育种研究进展 [J]. 广西植物, 30(3): 373-376.]
- ZHOU YQ, WANG WS, WANG XN, et al., 2015. Progress in DNA molecular markers and gene functions of *Rehmannia glutinosa* [J]. *Chin J Plant Sci*, 50(5): 665-672. [周延清, 王婉坤, 王向楠, 等, 2015. 地黄 DNA 分子标记与基因功能研究进展 [J]. 植物学报, 50(5): 665-672.]