

广西雀舌木属一新种

陈秀香
(广西中医药研究所)

A NEW SPECIES OF LEPTOPUS FROM GUANGXI

Chen Xiu-xiang
(Guangxi Institute of Traditional Medical & Pharmaceutical Sciences)

Key words *Leptopus*; *Leptopus pachyphyllus*

厚叶雀舌木 新种 图

Leptopus pachyphyllus X. X. Chen, sp. nov.

Species *L. chinensi* (Bunge) Pojark. affinis sed foliis coriaceis, petiolis crassis, brevioribus, 3—4 mm longis; sepalis masculis ovatis, coriaceis, majoribus, 3—4 mm longis 2.5—3 mm latis, extus glabris; lobis disci oblongis, apice truncatis differt.

Frutex, usque 2 m altus; ramuli teretes, brunneoli. Folia alterna, coriacea, rotundata, ovata vel ovato-elliptica, 2—5 cm longa, 1.5—2.5 cm lata, apice rotundata vel obtusa, basi rotundata vel late cuneata, margine integra, utrinque glabra; costa supra paulo impressa, subtus prominentia, nervi laterales inconspicui, utrinsecus 3—5-jugi; petioli 3—4 mm longi; stipulae minimae. Flores monoici, axillares solitarii. Flores masculi: pedicelli 2—2.5 cm longi; sepala 5, coriacea, rubella, imbricata, ovata, 3—4 mm longa, 2.5—3 mm lata, apice obtusa, basi connata, extus glabra; petala 5, membranacea, spathulata, 1.7 mm longa, 0.7 mm lata, apice acutiuscula; discus planus, 10-lobatus, lobis oblongis, apice truncatis; stamina 5, supra disci inserta, 1.6 mm longa, glabra, filamentis liberis, antheris ovatis. Flores feminei: pedicelli 2—2.8 cm longi; sepala 5, ovata, 5—6 mm longa, circ. 4 mm lata; petala 5, inconspicua, membranacea, circ. 1.5 mm longa, circ. 0.7 mm lata; discus annularis, glaber, ad medium 10-lobatus, inferne connatus lobis oblongis, apice truncatis; ovarium ovoideum, 3-loculare, glabrum; styli 3, erecti, glabri, ad basi 2-lobati. Capsula compresso-globosa, 8 mm diam., glabra basi calyce persistenti, tricocco, pericarpio tenui, endocarpio corneo. Semina 3 mm longa, glabra.

Guangxi: Huanjiang Xian, Xianan, Jingyang 23. Apr. 1978. Tan Yangsheng 4-3-424 (Holotypus, in herb. Guangxi Inst. Trad. Med. Pharm. conserv.).

灌木，高达2米；小枝褐色，圆柱形，近无毛。叶互生，革质，圆形至卵形或卵状椭圆形，长2—5厘米，宽1.5—2.5厘米，先端圆形或钝，基部圆形或阔楔形，两面无毛，边全缘；中肋上面稍凹，下面突起；侧脉不明显，3—5对；叶柄增厚，长3—4毫米，无毛；托叶微小。花单性；雌雄同株，单生于叶腋。雄花：花柄长2—2.5厘米，无毛；萼片5枚，卵形，革质，淡红色，复瓦状排列，长3—4毫米，宽2.5—3毫米，先端钝，基部连合，外面无毛；花瓣5，膜质，匙形，长约1.7毫米，宽约0.7毫米，先端稍尖；花盘平坦，10裂；裂片矩圆形，先端截形；雄蕊5枚，着生在花盘上，长约1.6毫米，无毛，花丝分离，花药卵形。雌花：花梗长2—2.8厘米，萼片5，较雄花的大，卵形，长5—6毫米，宽约4毫米，花瓣5，不明显，膜质，长约1.5毫米，宽约0.7毫米，花盘环状，10裂到中部，下部连合，裂片矩圆形，先端截形；子房卵形，3室；花柱3枚，直立，2裂至基部。蒴果扁球形，无毛，基部具宿存花萼，直径约8毫米，开裂为3个2裂的分果片，外果皮薄，内果皮角质。种子小，长约3毫米，无毛。花期4月。

叶止血，治皮肤溃疡。

广西：环江，下南乡，景阳大队，水洞生产队，1978年4月23日。谭杨胜4-3-424，（模式，存广西中医药研究所）。

本种与雀舌木 *L. chinensis* (Bunge) Pojark. 接近，但其叶革质；叶柄增厚，长3—4毫米；雄花萼片卵形，革质，较大，长3—4毫米，宽2.5—3毫米，外面无毛；花盘裂片矩圆形，先端截形；后者叶纸质；叶柄纤细，长6—8毫米；雄花萼片矩圆形，膜质，较小，长2—2.5毫米，宽约1.3毫米，外面疏被柔毛；花盘裂片卵形，先端尖而易于区别。




图 厚叶雀舌木 *Leptopus pachyphyllus*
X. X. Chen

1. 花枝；2. 雄花；3. 雌花。（廖信佩绘）