

广西螺序草属药用植物一新种

陈秀香 黄长春

(广西民族医药研究所, 南宁 530001)

Q949.4

A NEW SPECIES ON MEDICINAL PLANTS OF GENUS
SPIRADICLIS FROM GUANGXI

Chen Xiuxiang and Huang Changchun

(Guangxi National Medical Research Institute, Nanning 530001)

关键词 匙叶螺序草

Key word *Spiradiclis spathulata*

螺序草属, 新种;

匙叶螺序草 新种 图 裸地鞋(壮名)

Spiradiclis spathulata X. X. Chen et C. C. Huang, sp. nov.


Specie nova *S. cordatae* H. S. Lo et W. L. Sha, similis, sed differt. foliis apathulatis, basi anguste cuneatis; petiolis brevioribus, 5—8 mm longis; floribus majoribus, corollarum tubis 1.5—2.5 cm longis.

Herba pumila, saepe rosulata; caulibus inferne procumbentibus radicanibus, internodiis 3—4 mm longis. Folia confertim opposita, lamina chartacea, spathulata vel ovato-oblongata, 8—13 cm longa, 2—4.5 cm lata, apice obtusa vel rotunda, basi anguste cuneata, decurrens, margine integra, sicc. supra olivacea, subtus pallida, secus costas nervosque dense pubescentia; nervis lateralibus utrinque 13—25, atque costis subtus aequaliter prominentibus; petiolus 5—8 mm longus; stipula lanceolato-linearis, 7—9 mm longa, dense villosa. Cyma terminalis, 10—multi-flora, pedunculis 7—12 cm longis pubescentibus; bracteola linearilanceolata, 3—4 mm longa; calyx pubescens, tubo obconico 1.5—2 mm longo, lobis 5, angusto-lanceolatis, 1—1.3 mm longis; corolla purpureo-rubra, hypocrateriformis tubo gracile 1.5—2.5 cm longo, extus farinoso-piloso, intus medium annulo pilorum longorum alborum instructo, lobis 5, subovatis, 4—6 mm longis, 2—4 mm latis; stamina 5, prope basin tuborum corollarum inserta, filamentis brevibus, antheris linearibus circ. 3 mm longis; discus annularis; ovarium biloculare, utroque loculo ovalis numerosis; stylus filiformis circ. 2 cm longus, stigmatate clavato circ. 2 mm longo.

Guangxi: Ningming Xian, Duolong Xiang, Shade, on rocks, 20 v 1991

C. C. Huang 22986 (Holotypus in herb. Guangxi National Medical Research Institute Conserv).

矮小草本，通常莲座状；茎不分枝，下部生根；节间缩短，长3—4毫米。叶密集对生，叶片纸质，匙形或卵状倒披针形，长8—13厘米，宽2—4.5厘米，先端钝或圆形，基部狭楔形，下延，边全缘，有睫毛，干时上面橄榄绿色，疏被短柔毛，下面苍白色，沿中脉和侧脉密被柔毛，侧脉每边15—25条，和中脉均在下面突起；叶柄长5—8毫米；托叶披针状线形或线形，长7—9毫米，密被柔毛。聚伞花序顶生，有花10多朵；花序梗长7—12厘米，被柔毛；花柄长2—3毫米，被柔毛；小苞片线状披针形，长3—4毫米，被柔毛；花萼被柔毛；萼管倒圆锥形，长1.5—2毫米；裂片5，狭披针形，长1—1.3毫米；花冠紫红色，高脚碟状；管纤细，长1.5—2.5厘米，外面被粉状短柔毛，内面在中部被一环白色长毛；裂片5，近卵形，长4—6毫米，宽2—4毫米；雄蕊5，着生于冠管近基部，花丝短；花药线形，长约3毫米，花盘环状；子房2室，每室有多数胚珠，花柱长约2厘米，柱头棒状，椭圆形。



匙叶螺序草 *Spiradiclis spathulata* X. X. Chen
et C. C. Huang

1. 着花植株； 2. 花冠展开； 3. 雄蕊； 4. 花萼及雌蕊。（廖信佩绘）

广西：宁明县，驮龙乡，阴处，岩石上，1991年5月20日，黄长春等22986（模式标本，存广西民族医药研究所）。

本新种与心叶螺序草 *Spiradiclis cordata* H. S. Lo et W. L. Sha 相似，区别是叶匙形，基部狭楔形；叶柄短，长5—8毫米；花大；花冠紫红色，冠管长1.5—2.5厘米。后者叶心形，叶柄长2—7厘米；花较小，花冠白色，冠管长约6毫米而易区别。

本新种的全草民间用于刀伤、跌打损伤。