

中国高等植物省级分布新记录(二)

林 祁, 赵 燃, 班 勤

(中国科学院植物研究所, 北京 100093)

摘 要: 报道了槭树科、漆树科、大戟科、清风藤科、无患子科、苦木科共 18 种植物在我国 13 个省区中的分布新记录。其中福建分布新记录的植物有山地五月茶、甘肃分布新记录的有鸡爪槭, 广东、江苏和云南分布新记录的有湖北算盘子, 广西分布新记录的有五尖槭和滇赤才, 贵州分布新记录的有甜叶算盘子, 河南分布新记录的有红叶野桐, 湖南分布新记录的有狭序泡花树, 江西分布新记录的有长柄槭、柳叶五月茶和黑面神, 陕西分布新记录的有川滇无患子, 四川分布新记录的有伞花木, 西藏分布新记录的有五裂槭、中华槭、藤漆、小花清风藤和柔毛鸡胆子。

关键词: 槭树科; 漆树科; 大戟科; 清风藤科; 无患子科; 苦木科; 新记录

中图分类号: Q949.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-3142(2002)01-004-03

New records of higher plants from some provinces in China (II)

LIN Qi, ZHAO Ran, BAN Qin

(Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093, China)

Abstract: Eighteen species are reported as new records to thirteen provinces in China, i. e. *Antidesma montanum* Bl. (Euphorbiaceae) for Fujian, *Acer palmatum* Thunb. (Aceraceae) for Gansu, *Glochidion wilsonii* Hutch. (Euphorbiaceae) for Guangdong, Jiangsu and Yunnan, *Acer maximowiczii* Pax (Aceraceae) and *Aphania rubra* (Roxb.) Radl. (Sapindaceae) for Guangxi, *Glochidion philippicum* (Cav.) C. B. Rob. (Euphorbiaceae) for Guizhou, *Mallotus paxii* Pamp. (Euphorbiaceae) for Henan, *Meliosma paupera* Hand.-Mazz. (Sabiaceae) for Hunan, *Acer longipes* Franch. ex Rehd. (Aceraceae), *Antidesma pseudomicrophyllum* Croiz. and *Breymia fruticosa* (Linn.) Hook. f. (Euphorbiaceae) for Jiangxi, *Sapindus delavayi* (Franch.) Radlk. (Sapindaceae) for Shaanxi, *Eurycorymbus cavaleriei* (Lévl.) Rehd. et Hand.-Mazz. (Sapindaceae) for Sichuan, and *Acer oliverianum* Pax, *Acer sinense* Pax (Aceraceae), *Pegia nitida* Colobr. (Anacardiaceae), *Sabia parviflora* Wall. ex Roxb. (Sabiaceae) and *Brucea mollis* Wall. ex Kurz (Simaroubaceae) for Xizang.

Key words: Aceraceae; Anacardiaceae; Euphorbiaceae; Sabiaceae; Sapindaceae; Simaroubaceae; new record

本文继续报道在《中国高等植物》编研过程中所发现的中国高等植物省级分布新记录, 文中所列植物均记载在《中国高等植物》第八卷中, 凭证标本存中国科学院植物研究所标本馆(PE)。

1 槭树科 Aceraceae

1.1 长柄槭

Acer longipes Franch. ex Rehd. in Sarg. Trees

收稿日期: 2000-11-22

作者简介: 林 祁(1957-), 男, 湖南长沙人, 博士, 研究员, 植物分类学专业。

基金项目: 中国科学院基金重点项目(编号: KZ952-S1-129)部分内容

& Shrubs. 1: 178. 1905; W. P. Fang in Fl. Reip. Pop. Sin. 46: 99. 1981.

江西: 黎川县, 蚕平, 山谷林中, 海拔 700 m, 1957 年 10 月 11 日, 王名金等 2236; 铅山县, 黄岗山, 山沟林中, 1947 年 10 月 15 日, 熊耀国 6364.

分布: 陕西、河南、四川、湖北、湖南、福建和安徽。江西首次记录。

1.2 五尖槭

Acer maximowiczii Pax in Hook. Icon. Pl. 19: t. 1897. 1889; W. P. Fang in Fl. Reip. Pop. Sin. 46: 229. 1981.

广西: 兴安县, 猫儿山, 山顶林中, 1953 年 6 月, 广西队 4219(fl.); 资源县, 猫儿山, 1937 年 7 月 28 日, 钟济新 83463(fr.).

分布: 山西、河南、陕西、甘肃、宁夏、青海、湖北、湖南、四川和贵州。广西首次记录。

1.3 五裂槭

Acer oliverianum Pax in Hook. Icon. Pl. 19: t. 1897. 1889; W. P. Fang in Fl. Reip. Pop. Sin. 46: 168. 1981.

西藏: 墨脱县, 格当, 兴凯至江别塘途中, 山地林中, 海拔 2 600 m, 1982 年 9 月 26 日, 李渤生、程树志 1082; 林芝县, 八玉, 达波, 山地林中, 海拔 2 200 m, 1982 年 11 月 30 日, 李渤生、程树志 1919.

分布: 甘肃、陕西、河南、安徽、浙江、福建、江西、湖北、湖南、四川、贵州、广西和云南。西藏首次记录。

1.4 鸡爪槭

Acer palmatum Thunb. in Nova Acta Reg. Soc. Sci. Upsal. 4: 40. 1783; W. P. Fang in Fl. Reip. Pop. Sin. 46: 129. 1981.

甘肃: 文县, 碧石, 大道岭, 山坡林中, 海拔 1 100 m, 1958 年 10 月 23 日, 何叶琪 1459.

分布: 山东、河南、江苏、安徽、浙江、福建、江西、湖北、湖南、贵州和四川; 朝鲜及日本亦有。甘肃首次记录。

1.5 中华槭

Acer sinense Pax in Hook. Icon. Pl. 19: t. 1897. 1889; W. P. Fang in Fl. Reip. Pop. Sin. 46: 155. 1981.

西藏: 墨脱县, 汉密多雄曲, 山地林中, 海拔 2

150 m, 1983 年 6 月 14 日, 李渤生、程树志 5079.

分布: 安徽、江西、福建、湖北、湖南、四川、贵州、广东、广西和云南。西藏首次记录。

2 漆树科 Anacardiaceae

2.1 藤漆

Pegia nitida Colobr. in Trans. Linn. Soc. 15: 364. 1827; T. L. Ming in Fl. Reip. Pop. Sin. 45 (1): 90. 1980.

西藏: 墨脱县, 背崩, 路边林中, 海拔 900 m, 1983 年 5 月 29 日, 李渤生、程树志 4909(2 份, fr.); 同地, 希让西日河, 常绿阔叶林中, 海拔 700 m, 1983 年 4 月 20 日, 李渤生、程树志 4161(2 份, fl.).

分布: 云南、贵州和广西; 尼泊尔、锡金、印度、缅甸及泰国亦有。西藏首次记录。

3 大戟科 Euphorbiaceae

3.1 山地五月茶

Antidesma montanum Bl. Bijdr. 1: 1124. 1825; P. T. Li in Fl. Reip. Pop. Sin. 44(1): 60. 1994.

福建: 南靖县, 和溪, 1974 年 9 月 5 日, 236-6 队 1265(2 份, fr.).

分布: 广东、海南、广西、贵州、云南和西藏; 缅甸、越南、老挝、柬埔寨、马来西亚及印度尼西亚亦有。福建首次记录。

3.2 柳叶五月茶

Antidesma pseudomicrophyllum Croiz. in Journ. Arn. Arb. 21: 496. 1940; P. T. Li in Fl. Reip. Pop. Sin. 44(1): 58. 1994.

江西: 全南县, 青龙山, 海拔 600 m, 1958 年 4 月 26 日, 熊杰 530(fl.). 分布: 浙江、福建、湖南、广东、海南、广西和贵州。江西首次记录。

3.3 黑面神

Breynia fruticosa (Linn.) Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 331. 1887; P. T. Li in Fl. Reip. Pop. Sin. 44(1): 181. 1994. — *Andrachne fruticosa* Linn. Sp. Pl. 1014. 1753.

江西: 安远县, 孔田, 河边林中, 海拔 500 m, 1958 年 5 月 16 日, 胡启明 1963(fl.).

分布: 浙江、福建、广东、海南、广西、四川、贵州

和云南;越南亦有。江西首次记录。

3.4 甜叶算盘子

Glochidion philippicum (Cav.) C. B. Rob. in Philipp. Journ. Sci. Bot. **4**: 103. 1909; P. T. Li in Fl. Reip. Pop. Sin. **44** (1): 154. 1994. — *Bradleia philippica* C. v. Icon. **3**: 48. t. 371. 1797.

贵州: 安龙县, 化力, 甘河, 山沟林中, 海拔 800 m, 1960 年 5 月 13 日, 贵州队 3229 (fl.); 望谟县, 乐康, 山坡林中, 海拔 1 100 m, 1960 年 4 月 22 日, 贵州队 1928 (fl.); 罗甸县, 八茂, 茂井, 山坡林中, 1960 年 3 月 29 日, 海拔 170 m, 贵州队 257 (fr.); 贞丰县, 鲁贡, 山坡林中, 海拔 600 m, 1960 年 8 月 13 日, 贵州队 8135。

分布: 台湾、福建、广东、海南、广西、四川和云南; 菲律宾、马来西亚及印度尼西亚亦有。贵州首次记录。

3.5 湖北算盘子

Glochidion wilsonii Hutch. in. Sarg. Pl. Wilson. **2**: 518. 1916; P. T. Li in Fl. Reip. Pop. Sin. **44** (1): 159. 1994.

江苏: 南京市, 紫金山, 山坡灌丛, 1951 年 8 月 28 日, 刘昉勋 1351 (fr.)。广东: 连平县, 九连山, 溪边灌丛, 1957 年 5 月 9 日, 刘英光 225 (fl.)。云南: 彝良县, 龙海, 山坡灌丛, 海拔 1 550 m, 1972 年 9 月 21 日, 滇东北队 890 (fr.)。

分布: 安徽、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、广西、贵州和四川。江苏、广东和云南首次记录。

3.6 红叶野桐

Mallotus paxii Pamp. Nuov. Giorn. Bot. Ital. **17**: 414. 1910; S. M. Hwang in Fl. Reip. Pop. Sin. **44** (2): 40. 1996.

河南: 商城县, 景岗台, 牛志山, 山坡树丛, 海拔 200 m, 1959 年 4 月 22 日, 采集人不详, 采集号 208。

分布: 江苏、安徽、浙江、福建、江西、陕西、湖北、湖南、广东、广西、贵州和四川。河南首次记录。

4 清风藤科 Sabiaceae

4.1 狭序泡花树

Meliosma paupera Hand.-Mazz. Anz. Akad. Wiss. Wien. Math.-Nat. **58**: 150. 1921; Y. W. Law in Fl. Reip. Pop. Sin. **47** (1): 106. 1985.

湖南: 江华县, 水口, 采集年份不详, 6 月 15 日, 钟补勤 1012 (2 份, fl.)。

分布: 云南、贵州、广西、广东和江西; 越南亦有。湖南首次记录。

4.2 小花清风藤

Sabia parviflora Wall. ex Roxb. Fl. Ind. ed. Carey **2**: 310. 1824; Y. F. Wu in Fl. Reip. Pop. Sin. **47** (1): 93. 1985.

西藏: 墨脱县, 背崩, 地东, 稀让村, 江边常绿阔叶林下, 海拔 850 m, 1983 年 4 月 9 日, 李渤生、程树志 3986 (2 份, fl.)。

分布: 云南、贵州和广西; 尼泊尔、不丹、锡金、印度、缅甸、泰国、老挝、越南及印度尼西亚亦有。西藏首次记录。

5 无患子科 Sapindaceae

5.1 滇赤才

Aphania rubra (Roxb.) Radlk. Sap. Holl. Ind. **21**, 69. 1878; H. S. Lo in Fl. Reip. Pop. Sin. **47** (1): 20. 1985. — *Scytalia rubra* Roxb. Fl. Ind. ed. **2**, **2**: 272. 1832.

广西: 大新县, 生于石灰岩山地, 1981 年 5 月, 覃海宁 265。

分布: 云南; 印度、孟加拉、尼泊尔、锡金、不丹等国亦有。广西首次记录。

5.2 伞花木

Eurycorymbus cavaleriei (Lévl.) Rehd. et Hand.-Mazz. in Journ. Arn. Arb. **15**: 8. 1934; H. S. Lo in Fl. Reip. Pop. Sin. **47** (1): 65. 1985. — *Rhus cavaleriei* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **10**: 474. 1912.

四川: 巫溪县, 中梁乡, 黄连溪, 山地林中, 海拔 1 100 m, 1959 年 9 月 5 日, 杨光辉 65266 (fr.)。

分布: 云南、贵州、湖北、湖南、江西、福建、台湾、广东和广西。四川首次记录。

5.3 川滇无患子

Sapindus delavayi (Franch.) Radlk. in Sitzungsab. Math. Phys. Akad. Wiss. Munchen **20**: 233. 1890; H. S. Lo in Fl. Reip. Pop. Sin. **47** (1): 17. 1985. — *Pancovia delavayi* Franch. in Bull.

(下转第 3 页 Continue on page 3)