

DOI: 10.11931/guihaia.gxzw202108008

张汝胜, 李霞, 黄永林, 等, 2023. 广西地不容非药用部位化学成分研究 [J]. 广西植物, 43(1): 103–110.

ZHANG RS, LI X, HUANG YL, et al., 2023. Chemical constituents from non-medical parts of *Stephania kwangsiensis* [J].

Guihaia, 43(1): 103–110.



广西地不容非药用部位化学成分研究

张汝胜^{1,2}, 李霞¹, 黄永林², 王亚凤², 阳丙媛², 李典鹏², 何瑞杰^{2*}

(1. 桂林理工大学 化学与生物工程学院, 广西 桂林 541006; 2. 广西植物功能物质与资源持续

利用重点实验室, 广西壮族自治区 广西植物研究所, 广西 桂林 541006)

摘要: 广西地不容(*Stephania kwangsiensis*)为防己科藤本植物,主要分布于广西,其药用部位(块根)中药名为“金不换”,有镇静、杀虫、抗炎、抗肿瘤、抗病毒、抑菌的作用,用于治疗阿尔茨海默病。为了充分利用该植物资源,明确广西地不容非药用部位中的化学成分,并发现其相关的活性成分。该研究综合运用正相 Sephadex LH-20、正相硅胶、正相聚酰胺、MCI gel CHP-20P 等多种柱色谱法对广西地不容非药用部位甲醇提取物进行分离纯化,所得单体化合物的结构经 MS、¹H-NMR、¹³C-NMR 等波谱学数据分析及相关文献对照进行鉴定,同时用滤纸法对分离得到的化合物开展抗细菌(大肠杆菌、金色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌)和抗真菌(尖孢镰刀菌)的活性评价。结果表明:(1)从该植物中分离得到的 10 个化合物分别鉴定为吐叶醇(1)、蚱蜢酮(2)、异紫堇定碱(3)、2-O-β-D-glucopyranosyl-D-arabinitol(4)、(9S, 12S, 13S)-trihydroxyoctadeca-(10E, 15Z)-dienoic acid(5)、magnoflorine(6)、corchoionoside C(7)、委陵菜酸(8)、紫堇定碱(9)、克班宁(10)。其中,化合物 1、2、4、5、6、7、8 为首次从该植物中分离得到,化合物 1、2、4、5、7、8 为首次从该属植物中分离得到,化合物 4 为首次从天然产物中分离得到。(2)在化合物浓度为 6 mg·mL⁻¹时,化合物 1、2、5 对大肠杆菌具有弱抑菌作用,化合物 2 对金色葡萄球菌有弱的抑菌活性,化合物 3 和化合物 8 对枯草芽孢杆菌有弱的抑制作用。综上所述,广西地不容非药用部位含有丰富的活性成分,具有开发利用的潜力。

关键词: 广西地不容, 化学成分, 结构鉴定, 生物碱, 抑菌活性

中图分类号: Q946.88 文献标识码: A 文章编号: 1000-3142(2023)01-0103-08

Chemical constituents from non-medical parts of *Stephania kwangsiensis*

ZHANG Rusheng^{1,2}, LI Xia¹, HUANG Yonglin², WANG Yafeng²,
YANG Bingyuan², LI Dianpeng², HE Ruijie^{2*}

收稿日期: 2022-01-09

基金项目: 国家自然科学基金(32060108, 82060764); 广西自然科学基金(2018GXNSFAA294033, 2018GXNSFAA281078); 中国博士后专项基金(200626); 广西植物研究所基本业务费项目(桂植业 18004); 广西创新驱动发展专项基金(桂科 AA18118015); 广西植物功能物质与资源持续利用重点实验室开放基金(ZRJJ2020-2, ZRJJ2018-19); 省部共建药用资源化学与药物分子工程国家重点实验室开放基金(CMEMR2019-B13); 广东省重点领域研发计划项目(2020B1111110003); 中央引导地方科技发展专项(桂科 20111010)。

第一作者: 张汝胜(1996-), 硕士研究生, 主要从事天然产物的研究与开发, (E-mail) 527264216@qq.com。

通信作者: 何瑞杰, 博士, 副研究员, 主要从事天然产物化学的研究与开发利用, (E-mail) heruijie937@163.com。

(1. College of Chemistry and Bioengineering, Guilin University of Technology, Guilin 541006, Guangxi, China; 2. Guangxi Key Laboratory of Plant Functional Phytochemicals and Sustainable Utilization, Guangxi Institute of Botany, Guangxi Zhuang Autonomous Region and Chinese Academy of Sciences, Guilin 541006, Guangxi, China)

Abstract: *Stephania kwangsiensis*, a vine plant of the Stephaniaceae family, is mainly spread in Guangxi, China. The medicinal part (root tuber) of *S. kwangsiensis*, “Jin Bu Huan” in Chinese, is often used for sedative, insecticidal, anti-inflammatory, anti-tumor, antiviral and antibacterial, as well as for the treatment of Alzheimer’s disease. In order to make full use of the plant resources, clarify its chemical constituents, and find the relevant active compounds, the methanol extracts of non-medicinal parts of this plant were isolated using various chromatographic methods such as positive phase Sephadex LH-20, positive phase silica gel, positive phase polyamide, and MCI gel CHP-20P. The structures of the isolated monomer compounds were determined by MS, ¹H-NMR, ¹³C-NMR, and other spectral data analysis, as well as comparison with relevant literatures. The activities of the isolated compounds from *S. kwangsiensis* against bacteria (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*) and fungi (*Fusarium oxysporum*) were evaluated using filter paper method. The results were as follows: (1) A total of 10 compounds obtained from the non-medicinal parts of this plant were identified as vomifoliol (1), grasshopper ketone (2), isocorydine (3), 2-O-β-D-glucopyranosyl-D-arabinitol (4), (9S, 12S, 13S)-trihydroxyoctadeca-(10E, 15Z)-dienoic acid (5), magnoflorine (6), corchoionoside C (7), tormentic acid (8), corydine (9) and crebanine (10). Among them, compounds 1, 2, 4, 5, 6, 7 and 8 were isolated from this plant for the first time, compounds 1, 2, 4, 5, 7 and 8 were firstly obtained from this genus plants, and Compound 4 was found from natural products for the first time. (2) At concentration of 6 mg · mL⁻¹, compounds 1, 2 and 5 showed weak antibacterial activities against *Escherichia coli*; Compound 2 exhibited weak antibacterial activities against *Staphylococcus aureus*; compounds 3 and 8 displayed weak antibacterial activities against *Bacillus subtilis*. In conclusion, the non-medicinal parts of *Stephania kwangsiensis* contain large numbers of active components and have the potential of development and utilization.

Key words: *Stephania kwangsiensis*, chemical constituents, structural identification, alkaloid, antibacterial activity

广西地不容 (*Stephania kwangsiensis*) 属于防己科 (Menispermaceae) 千金藤属 (*Stephania*) 多年生草质落叶藤本植物, 长超过 3 m, 块根通常扁球形, 叶互生、纸质, 叶柄于叶基部 1~1.5 cm 处盾状着生, 长 4~9 cm, 叶片三角状圆形至近圆形, 主产于我国广西西北部至西南部, 生于石灰岩地区的山地灌丛 (中国科学院中国植物志委员会, 1996)。防己科植物大多含有丰富的生物碱, 具有较高的药用价值。广西地不容药用部位 (块根) 含有丰富的生物碱, 具有很好的生物活性, 如镇痛和抗炎作用 (罗昱澜等, 2017)、抑菌活性 (邓业成等, 2006)、杀虫活性 (邓业成和徐汉虹, 2005)、抗病毒活性 (郝静等, 2008)。在临床上主要用于镇痛、解热 (王宪楷和赵同芳, 1990)、镇静 (金国章, 1987) 等。广西地不容作为广西地方特色药用植物, 其非药用部位 (茎、叶) 的资源存量巨大, 而对于野生资源日益匮乏的今天, 从非药用部位中寻找可替代药用部位中一些有效成分的研究显得尤其重要。

广西地不容植物富含生物碱, 由于该类成分在分离纯化过程中极易被柱材料吸附, 从而导致拖尾严重、收率低, 因此生物碱的分离一直是天然产物研究领域的一个热点和难点问题。本研究以广西地不容非药用部位 (茎、叶) 为对象, 依托现代先进的仪器设备, 采用 Sephadex LH-20、碱化硅胶、聚酰胺、MCI gel CHP-20P 等多种柱色谱法和现代波谱学技术以及现代药理学技术, 拟探讨以下问题: (1) 广西地不容非药用部位甲醇提取物中的化学成分; (2) 所分离得到的部分化合物的抗菌活性。

1 材料与amp;方法

1.1 材料、仪器和试剂

植物材料: 广西地不容地上部分于 2019 年 8 月采自广西桂林恭城瑶族自治县, 经广西植物研究所黄俞淞副研究员鉴定为广西地不容 (*Stephania kwangsiensis*) 的非药用部位, 标本 (编号: 20190824) 保存于广西植物功能物质与资源持续

利用重点实验室。

供试菌种: 所用菌种为大肠杆菌 (*Escherichia coli*)、金色葡萄球菌 (*Staphylococcus aureus*)、枯草芽孢杆菌 (*Bacillus subtilis*)、尖孢镰刀菌 (*Fusarium oxysporum*), 均由桂林理工大学化学与生物工程学院李海云老师课题组提供。

仪器: LC-MS/IF-TOF 液质联用色谱仪 (日本, 岛津公司)、Bruker Avance III HD-500 MHz 超导核磁共振波谱仪 (瑞士, Bruker 公司)、OSB-2100 油浴锅、真空泵 (上海爱朗仪器有限公司)、HH·BII·360-S-II 恒温培养箱 (上海跃进医疗器械厂)、SW-CJ-1F 超净工作台 (苏净集团安泰公司)、TQZ-312 振荡器 (上海精宏实验设备有限公司)、YXQ-LS-50SII 高压灭菌锅 (上海博迅实业有限公司医疗设备厂)。

材料与试剂: Sephadex LH-20 (GE Healthcare Bio-Science AB, Sweden)、MCI gel CHP-20P (75 ~ 150 μm ; Mitsubishi Chemical, Tokyo, 日本)、硅胶 (200 ~ 300 目, 青岛海洋化工有限公司)、聚酰胺 (100 ~ 200 目, 江苏长丰化工有限公司)、TLC 薄层色谱板 (德国 Merck 公司)、LB 营养琼脂 (青岛高科技工业园海博生物技术有限公司)、LB 肉汤 (青岛高科技工业园海博生物技术有限公司)、氨苄青霉素 (上海源叶生物科技有限公司)、99% 生物技术级二甲基亚砜 (DMSO, 上海麦克林生化科技有限公司)、提取与分离所使用的试剂皆为实验室常用分析纯。

1.2 提取和分离

取干燥广西地不容地上部分 4.2 kg, 粉碎后用甲醇室温浸提 3 次, 每次 30 L, 每次 1 周, 合并过滤提取液, 减压浓缩后得到浸膏 480.1 g。浸膏加蒸馏水使其混悬后依次使用石油醚、乙酸乙酯、正丁醇各萃取 3 次, 减压回收萃取溶剂, 得石油醚萃取物 44.0 g、乙酸乙酯萃取物 33.4 g、正丁醇萃取物 80.0 g。取正丁醇萃取物 75.0 g 上 MCI 柱层析 (7 cm \times 80 cm), 用甲醇-水 (0%、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%) 进行梯度洗脱, 经 TLC 薄层层析检测后合并得到 12 个馏分, 即 Fr. 1 ~ Fr. 12。将 Fr. 1 (26.3 g) 进行 Sephadex LH-20 柱色谱 (甲醇-水, 0% ~ 100%, 每 20% 为 1 个梯度) 分离纯化, 得到 5 个馏分, 即 Fr. 1-1 ~ Fr. 1-5。将 Fr. 1-1 (16.8 g) 进行反复 Sephadex LH-20 柱层析 (20% 甲醇-水) 得到化合

物 **4** (8.7 g)。将 Fr. 2 (3.6 g) 用二氯甲烷: 甲醇: 水体系 (36: 1: 0.1, 18: 1: 0.1, 9: 1: 0.1, V/V/V) 进行硅胶柱层析, 得到 6 个馏分, 即 Fr. 2-1 ~ Fr. 2-6。将 Fr. 2-2 (1.2 g) 用二氯甲烷: 甲醇体系 (100: 0 ~ 50: 50, V/V) 进行聚酰胺柱层析, 得到 9 个馏分, 即 Fr. 2-2-1 ~ Fr. 2-2-9。将 Fr. 2-2-1 (0.2 g) 用二氯甲烷: 甲醇 (1: 1, V/V) 进行 Sephadex LH-20 柱色谱分离纯化得到化合物 **1** (12.0 mg)、**2** (3.0 mg)、**3** (6.1 mg)、**8** (5.3 mg)。将 Fr. 3 (8.4 g) 用二氯甲烷: 甲醇体系 (1: 1, V/V) 进行反复 Sephadex LH-20 柱色谱分离, 得到 6 个馏分, 即 Fr. 3-1 ~ Fr. 3-6。将 Fr. 3-3 (1.5 g) 用二氯甲烷: 甲醇: 水体系 (18: 1: 0.1, 9: 1: 0.1, 8: 2: 0.2, V/V/V) 进行反复硅胶柱层析等色谱技术分离纯化, 最终得到化合物 **5** (4.5 mg)、**6** (5.1 mg)、**7** (6.3 mg)、**9** (11.0 mg)、**10** (3.3 mg)。化合物 **1**~**10** 的化学结构如图 1 所示。

2 化合物的结构鉴定

化合物 **1** $\text{C}_{13}\text{H}_{20}\text{O}_3$, 无色固体, $[\alpha]_{\text{D}}^{25} + 36.0$ (c 0.16, MeOH)。HR-ESI-MS m/z : 225.1461 $[\text{M} + \text{H}]^+$ 。¹H-NMR (500 MHz, MeOD) δ : 5.88 (1H, s, H-4), 5.79 (2H, d, $J = 6.3$ Hz, H-7, H-8), 4.37 (1H, m, H-9), 2.51 (1H, d, $J = 16.9$ Hz, H-2), 2.16 (1H, d, $J = 16.9$ Hz, H-2), 1.93 (3H, d, $J = 1.4$ Hz, H-13), 1.24 (3H, d, $J = 6.4$ Hz, H-10), 1.04 (3H, s, H-12), 1.01 (3H, s, H-11)。¹³C-NMR (125 MHz, MeOD) δ : 42.4 (C-1), 50.7 (C-2), 201.4 (C-3), 130.0 (C-4), 163.9 (C-5), 79.5 (C-6), 127.1 (C-7), 136.9 (C-8), 68.7 (C-9), 24.5 (C-10), 23.8 (C-11), 23.4 (C-12), 19.6 (C-13)。以上数据与文献 (Zhang et al., 2021) 报道一致, 故鉴定化合物 **1** 为吐叶醇。

化合物 **2** $\text{C}_{13}\text{H}_{20}\text{O}_3$, 无色固体, $[\alpha]_{\text{D}}^{25} - 27.0$ (c 0.1, MeOH)。HR-ESI-MS m/z : 247.1281 $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 。¹H-NMR (500 MHz, MeOD) δ : 5.84 (1H, s, H-8), 4.23 (1H, m, H-3), 2.23 (1H, m, H-4a), 2.20 (3H, s, H-10), 1.93 (1H, m, H-2a), 1.42 (1H, m, H-2b), 1.39 (6H, s, H-12, 13), 1.30 (1H, m, H-4b), 1.16 (3H, s, H-11)。¹³C-




图 1 化合物 1-10 的化学结构

Fig. 1 Chemical structures of compounds 1-10

NMR (125 MHz, MeOD) δ : 37.0 (C-1), 49.9 (C-2), 64.4 (C-3), 49.7 (C-4), 72.5 (C-5), 120.0 (C-6), 211.6 (C-7), 101.1 (C-8), 201.0 (C-9), 26.5 (C-10), 29.3 (C-11), 32.3 (C-12), 30.8 (C-13)。以上数据与文献(Le et al., 2019)报道一致,故鉴定化合物 2 为蚱蜢酮。

化合物 3 $C_{20}H_{23}NO_4$, 黑灰色油状, $[\alpha]_D^{25} + 274$ (c 1.0, MeOH)。HR-ESI-MS m/z : 342.168 5 $[M+H]^+$ 。 1H -NMR (500 MHz, MeOD) δ : 8.70 (1H, s, H-11), 6.86 (1H, d, $J = 8.1$ Hz, H-9), 6.83 (1H, d, $J = 8.1$ Hz, H-8), 6.71 (1H, s, H-3), 2.86 (1H, d, $J = 13.2$ Hz, H-6), 2.31 (1H, t, $J = 13.2$ Hz, H-5), 3.69 (3H, s, 1-OCH₃), 3.90 (6H, s, 2, 10-OCH₃), 3.04 (3H, s, N-

CH₃)。 ^{13}C -NMR (125 MHz, MeOD) δ : 143.0 (C-1), 150.6 (C-2), 116.0 (C-3), 29.4 (C-4), 50.0 (C-5), 62.2 (C-6), 35.9 (C-7), 120.7 (C-8), 112.7 (C-9), 150.3 (C-10), 144.2 (C-11), 126.0 (C-12), 127 (C-13), 130.2 (C-14), 129.0 (C-15), 125.0 (C-16), 44.0 (C-17), 54.0 (2-OCH₃), 64.3 (1-OCH₃), 56.5 (10-OCH₃)。以上数据与文献(邓业成和徐汉虹, 2004)报道一致,故鉴定化合物 3 为异紫堇定碱。

化合物 4 $C_{12}H_{24}O_{10}$, 灰色结晶, $[\alpha]_D^{16} - 15.60$ (c 3.2, DMSO)。HR-ESI-MS m/z : 329.141 8 $[M+H]^+$ 。 1H -NMR (500 MHz, DMSO- d_6) δ : 5.75 (1H, s, H-2), 4.62 (1H, s, H-2'), 4.43 (1H, s, H-3), 4.37 (1H, s, H-6), 4.19

(1H, d, $J = 7.9$ Hz, H-1'), 3.74 (1H, m, H-3'), 3.13 (2H, m, H-5), 1.80 (1H, m, H-4)。¹³C-NMR (125 MHz, DMSO- d_6) δ : 63.85 (C-1), 79.5 (C-2), 72.5 (C-3), 72.8 (C-4), 67.9 (C-5), 68.1 (C-6), 101.5 (C-1'), 74.3 (C-2'), 77.6 (C-3'), 71.5 (C-4'), 78.1 (C-5'), 63.1 (C-6')。以上数据与文献(Kaneda, 1990)的报道一致,故鉴定化合物 4 为 2-*O*- β -D-glucopyranosyl-D-arabinitol。

化合物 5 $C_{18}H_{32}O_5$, 白色固体, $[\alpha]_D^{25} -10.90$ (c 1.01, MeOH)。HR-ESI-MS m/z : 315.215 1 $[M+H]^+$ 。¹H-NMR (500 MHz, MeOD) δ : 5.68 (2H, m, H-10, 11), 5.42 (2H, m, H-15, 16), 4.02 (1H, m, H-9), 3.90 (1H, m, H-12), 3.44 (1H, m, H-13), 2.25 (2H, m, H-14), 2.04 (2H, m, H-2), 1.59 (1H, m, H-3), 1.36 (1H, m, H-8), 1.59 (1H, m, H-7), 1.30 (6H, br m, H-4, 5, 6), 0.90 (3H, t, $J = 7.5$ Hz, H-18)。¹³C-NMR (125 MHz, MeOD) δ : 177.8 (C-1), 35.0 (C-2), 26.1 (C-3), 30.6 (C-4), 30.4 (C-5), 30.2 (C-6), 26.5 (C-7), 38.3 (C-8), 73.0 (C-9), 136.5 (C-10), 131.1 (C-11), 75.8 (C-12), 76.5 (C-13), 31.5 (C-14), 126.4 (C-15), 134.4 (C-16), 21.7 (C-17), 14.57 (C-18)。以上数据与文献(Ying et al., 2007)的报道一致,故鉴定化合物 5 为 (9*S*, 12*S*, 13*S*)-trihydroxyoctadeca-(10*E*, 15*Z*)-dienoic acid。

化合物 6 $C_{20}H_{24}NO_4$, 黑色油状。HR-ESI-MS m/z : 343.175 8 $[M+H]^+$ 。¹H-NMR (500 MHz, MeOD) δ : 6.78 (1H, d, $J = 7.9$ Hz, H-9), 6.66 (1H, d, $J = 7.9$ Hz, H-8), 6.37 (1H, s, H-3), 4.09 (1H, d, $J = 13.8$ Hz, H-15), 3.60 (3H, s, 10-OCH₃), 3.53 (1H, br d, $J = 12.4$ Hz, H-1), 3.71 (3H, s, 2-OCH₃), 3.35 (3H, s, N-CH₃), 2.90 (3H, s, N-CH₃), 2.72 (1H, m, H-4), 2.60 (2H, br t, $J = 12.9$ Hz, H-7)。¹³C-NMR (125 MHz, MeOD) δ : 148.0 (C-1), 152.4 (C-2), 122.5 (C-3a), 110.1 (C-3), 24.7 (C-4), 62.4 (C-5), 126.3 (C-7a), 31.7 (C-7), 118.4 (C-8), 111.2 (C-9), 151.2 (C-10), 147.6 (C-11), 122.8 (C-12), 118.0 (C-13), 121.3 (C-14), 71.0 (C-15), 56.5 (-OCH₃), 54.0 (N-CH₃),

56.3 (-OCH₃), 43.6 (N-CH₃)。以上数据与文献(李海滨, 2006; 王建忠等, 2013)报道一致,故鉴定化合物 6 为 magnoflorine。

化合物 7 $C_{20}H_{32}O_7$, 橙黄色油状, $[\alpha]_D^{22} +60.4$ (c 0.96, MeOH)。HR-ESI-MS m/z : 385.220 6 $[M-H]^-$ 。¹H-NMR (500 MHz, MeOD) δ : 5.94 (1H, d, $J = 15.6$ Hz, H-7), 5.84 (1H, s, H-4), 5.70 (1H, dd, $J = 15.6, 7.3$ Hz, H-8), 4.50 (1H, m, H-9), 4.24 (1H, d, $J = 7.8$ Hz, H-1'-Glc), 3.82 (1H, dd, $J = 11.9, 2.3$ Hz, H-6a'), 3.60 (1H, dd, $J = 11.9, 6.1$ Hz, H-6b'), 3.18 (4H, m, H-2', 3', 4', 5'), 2.58 (1H, d, $J = 16.8$ Hz, H-2a), 2.15 (1H, d, $J = 16.8$ Hz, H-2b), 1.89 (3H, s, H-11), 1.26 (3H, d, $J = 6.4$ Hz, H-10), 1.01 (3H, s, H-12), 0.99 (3H, s, H-13)。¹³C-NMR (125 MHz, MeOD) δ : 42.4 (C-1), 50.8 (C-2), 201.3 (C-3), 127.1 (C-4), 167.2 (C-5), 80.0 (C-6), 133.8 (C-7), 133.7 (C-8), 74.7 (C-9), 22.2 (C-10), 19.6 (C-11), 23.5 (C-12), 24.7 (C-13), 101.3 (C-1'), 75.0 (C-2'), 78.2 (C-3'), 71.7 (C-4'), 78.4 (C-5'), 62.8 (C-6')。以上数据与文献(Yoshikawa et al., 1997)的报道一致,故鉴定化合物 7 为 corchoionoside C。

化合物 8 $C_{30}H_{48}O_5$, 灰色无定形粉末, $[\alpha]_D^{18} -21.7$ (c 0.12, MeOH)。HR-ESI-MS m/z : 487.335 4 $[M-H]^-$ 。¹H-NMR (500 MHz, MeOD) δ : 5.28 (1H, t, $J = 4.0$ Hz, H-12), 3.84 (1H, m, H-2), 2.50 (1H, s, H-18), 1.34 (3H, s, H-27), 1.29 (3H, d, $J = 5.2$ Hz, H-30), 1.19 (3H, s, H-29), 1.00 (3H, s, H-23)。¹³C-NMR (125 MHz, MeOD) δ : 48.5 (C-1), 69.5 (C-2), 84.5 (C-3), 39.5 (C-4), 56.7 (C-5), 19.3 (C-6), 33.6 (C-7), 40.5 (C-8), 48.4 (C-9), 39.0 (C-10), 24.6 (C-11), 129.4 (C-12), 140.0 (C-13), 42.6 (C-14), 29.6 (C-15), 26.6 (C-16), 49.3 (C-17), 55.0 (C-18), 73.6 (C-19), 43.0 (C-20), 27.3 (C-21), 39.5 (C-22), 29.6 (C-23), 17.5 (C-24), 17.1 (C-25), 17.5 (C-26), 24.9 (C-27), 181.0 (C-28), 27.1 (C-29), 16.6 (C-30)。以上数据与文献(许琼明等, 2009)报道一致,故鉴定化合物 8 为委陵菜酸。

化合物 9 $C_{20}H_{23}NO_4$, 黑色油状。HR-ESI-MS

m/z : 342.168 5 $[M+H]^+$ 。¹H-NMR (500 MHz, MeOD) δ : 7.15 (1H, d, $J = 8.2$ Hz, H-9), 7.02 (1H, d, $J = 8.2$ Hz, H-8), 6.81 (1H, s, H-3), 2.58 (3H, s, H-17), 3.68 (3H, s, 2-OCH₃), 3.91 (3H, s, 10-OCH₃), 3.86 (3H, s, 11-OCH₃)。¹³C-NMR (125 MHz, MeOD) δ : 143.2 (C-1), 150.5 (C-2), 113.5 (C-3), 29.28 (C-4), 62.3 (C-5), 64.3 (C-6), 35.9 (C-7), 125.6 (C-8), 112.8 (C-9), 153.5 (C-10), 145.5 (C-11), 127.0 (C-12), 119.3 (C-13), 120.6 (C-14), 131.2 (C-15), 128.8 (C-16), 43.9 (C-17), 53.8 (2-OCH₃), 56.3 (11-OCH₃), 56.6 (10-OCH₃)。以上数据与文献(邓业成和徐汉虹, 2004)报道一致, 故鉴定化合物 **9** 为紫堇定碱。

化合物 **10** C₂₀H₁₉NO₄, 黄色针晶。HR-ESI-MS m/z : 338.137 2 $[M+H]^+$ 。¹H-NMR (500 MHz, MeOD) δ : 7.99 (1H, d, $J = 8.6$ Hz, H-11), 7.06 (1H, d, $J = 8.6$ Hz, H-10), 6.71 (1H, s, H-3), 6.25 (1H, d, $J = 1.5$ Hz, -OCH₂O-), 6.10 (1H, d, $J = 1.5$ Hz, -OCH₂O-), 4.09 (3H, s, 8-OCH₃), 4.00 (3H, s, 9-OCH₃), 2.77 (3H, s, N-CH₃)。¹³C-NMR (125 MHz, MeOD) δ : 142.2 (C-1), 123.2 (C-1a), 146.7 (C-2), 107.0 (C-3), 126.7 (C-3a), 29.35 (C-4), 53.8 (C-5), 44.2 (C-6), 62.0 (C-6a), 27.0 (C-7), 116.7 (C-7a), 152.2 (C-8), 146.0 (C-9), 110.4 (C-10), 124.8 (C-11), 130 (C-11a), 100.7 (-OCH₂O-), 55.9 (8-OCH₃), 60.8 (9-OCH₃)。以上数据与文献(彭树林等, 1992)报道一致, 故鉴定化合物 **10** 为克班宁。

3 体外抗菌活性研究

3.1 培养基配置

固体培养基的配置: 称取 LB 营养琼脂 8 g 使其完全溶解于 200 mL 蒸馏水中, 于 121 °C 高温下灭菌 20 min, 备用。

液体培养基的配置: 称取 LB 肉汤 5 g 于 200 mL 蒸馏水中使其完全溶解, 于 121 °C 高温下灭菌 20 min, 备用。

3.2 体外抗菌实验

采用滤纸片法测定其抑菌圈的大小。以 DMSO 为溶剂, 准确称取各个化合物, 将其配置成

6 mg · mL⁻¹ 的样品溶液, 测定各个化合物对各种菌的抑制效果。参照胡野(2004)的方法, 具体的实验步骤如下: (1) 将实验所用到的滤纸片、镊子、培养皿、三角刮刀、移液枪头等用品用干净的报纸包好后放入高温灭菌锅中, 在 121 °C 下高温杀菌 20 min, 备用; (2) 菌种接种, 将指示菌种采用划线法接种于制备好的琼脂斜面培养基上, 在 (36 ± 1) °C 的培养箱里培养 24 h 后放入冰箱内保存, 备用; (3) 菌悬液的配制, 在相应的琼脂斜面培养基上用接种环在培养好的菌种内取 1 环菌种放入对应的液体培养基中, 在 (37 ± 1) °C 下进行恒温震荡 24 h 后, 取 100 μL 培养好的菌悬液, 用无菌水稀释 300 倍, 使菌悬液稀释到 10⁶ ~ 10⁸ CFU · mL⁻¹, 并置于 4 °C 下冷藏, 备用; (4) 样品溶液的配制, 将准备好的 0.6 cm 大小的滤纸片经过高温灭菌后, 浸泡在配好浓度的样品溶液以及空白对照溶液中 1 h 左右; (5) 抑菌圈的测定, 在无菌操作台中用移液枪吸取 200 μL 菌悬液于平板固体培养基上, 先使用三角刮刀在培养基上均匀涂抹, 再放在直径为 0.6 cm 完全浸满样品的滤纸片上, 在 (36 ± 1) °C 下培养 24 h, 最后测定其抑菌圈直径。实验平行 3 次, 用 DMSO 作为阴性对照, 用氨苄青霉素 (AMP, 100 mg · mL⁻¹, 即称取 100 mg 氨苄青霉素溶解于 1 mL 1 mol · L⁻¹ HCl 中) 作为阳性对照。

3.3 结果和分析

分别用大肠杆菌、金色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、尖孢镰刀菌作为供试菌, 将从广西地不容非药用部位中分离得到的化合物通过滤纸片法测定其抑菌圈的直径, 测定结果如表 1 所示。表 1 结果显示, 与阳性对照 AMP 比较, 化合物 **1**、**2**、**5** 对大肠杆菌的抑制作用显著降低 ($P < 0.05$), 化合物 **2** 对金色葡萄球菌的抑制率极显著低于阳性对照 AMP 的抑制率 ($P < 0.01$), 化合物 **3** 和化合物 **8** 对枯草芽孢杆菌有弱的抑制作用, 但无显著性差异 ($P > 0.05$)。

4 讨论与结论

本研究从广西地不容非药用部位醇提物中分离鉴定出 4 个阿朴啡生物碱。其中, 异紫堇定碱 (**3**) 是“解痉宁”的主要成分, 并具有很好的止泻功效, 这与沈雅琴和张明发(1998)的研究结果一致, 在临床上主要用于治疗胃肠、胆、血管等痉挛

表 1 广西地不容非药用部位化学成分的抑菌活性
Table 1 Antimicrobial activities of chemical constituents from non-medicinal parts of *Stephania kwangsiensis*

样品 Sample	抑菌圈直径 Φ (cm)			
	大肠杆菌 <i>Escherichia coli</i>	金色葡萄球菌 <i>Staphylococcus aureus</i>	枯草芽孢杆菌 <i>Bacillus subtilis</i>	尖孢镰刀菌 <i>Fusarium oxysporum</i>
1	0.7*	0.6	0.6	0.6
2	0.7*	0.8**	0.6	0.6
3	0.6	0.6	0.7	0.6
5	0.7*	0.6	0.6	0.6
8	0.6	0.6	0.7	0.6
DMSO	0.6	0.6	0.6	0.6
AMP	1.7	2.2	1.4	1.6

注: 与阳性对照组比较, * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$ 。

Note: Compared with positive control group, * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$.

所致的疼痛; Magnoflorine (**6**) 具有使心血管系统处于高动力状态的效用, 有利于运动员较长时间维持高强度运动能力, 有抗疲劳功效, 这与吕莹等 (2001) 的研究结果一致; 克班宁 (**10**) 具有抗心律失常的作用, 这与淤泽溥等 (1992) 的研究结果一致, 可诱导人类癌细胞的 G1 阻滞和凋亡作用 (Wongsirisirt et al., 2012), 以及通过抑制 MAPKs 和 Akt 信号通路表现出抗炎活性 (Intayoung et al., 2016)。邓业成等 (2006) 研究发现, 广西地不容药用部位 (块根) 的提取物具有广谱抗菌作用, 而由于本研究从广西地不容非药用部位中所分离得到的化合物在浓度为 $6 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 时对实验所选用的菌种均显示较弱的抑制作用, 因此对于非药用部位是否存在较强的抗菌成分还有待进一步研究。广西地不容植物富含生物碱, 使用普通柱层析分离会因不可逆吸附产生而导致样品损失量大, 本研究使用了氨蒸汽碱化硅胶柱材料, 极大地改善了不可逆吸附的产生, 提高了分离效率, 这与刘吉华等 (2013) 的研究结果一致。本研究结果为广西地不容植物其他部位以及其他生物碱的分离提供了方法指导。同时, 广西地不容的非药用部位 (茎、叶) 作为中药“金不换”的一个副产物, 由于其蕴含多种生物碱成分, 如异紫堇定碱、magnoflorine、克班宁已在临床中被广泛使用, 因此该部分资源开发潜力巨大, 随着更多化学成分被

发现以及其药理研究的深入, 该部位有作为新药用源的可能。

参考文献:

- Chinese Botanical Society Editorial Board of Chinese Academy of Sciences, 1996. Flora Reipublicae Popularis Sinicae: Volume 30, Division 1 [M]. Beijing: Science Press: 67-69. [中国科学院中国植物志委员会, 1996. 中国植物志: 第 30 卷第 1 分册 [M]. 北京: 科学出版社: 67-69.]
- DENG YC, LI JR, GAO CW, et al., 2006. Inhibitory activity of the extract from the root tubers of *Stephania kwangsiensis* and its compounds against pathogenic fungi and bacteria [J]. Plant Prot, 32(4): 43-46. [邓业成, 李洁荣, 高成伟, 等, 2006. 广西地不容提取物及其化合物的抑菌活性 [J]. 植物保护, 32(4): 43-46.]
- DENG YC, XU HH, 2005. Studies on insecticidal activities and active ingredients of *Stephania kwangsiensis* Lo. [J]. Sci Agric Sin, 38(3): 523-527. [邓业成, 徐汉虹, 2005. 广西地不容的杀虫活性及有效成分研究 [J]. 中国农业科学, 38(3): 523-527.]
- DENG YC, XU HH, 2004. Alkaloids from the tubers of *Stephania kwangsiensis* [J]. J Guangxi Norm Univ (Nat Sci Ed), 22(4): 73-77. [邓业成, 徐汉虹, 2004. 广西地不容块根生物碱成分研究 [J]. 广西师范大学学报 (自然科学版), 22(4): 73-77.]
- HAO J, WANG YF, ZHANG MY, et al., 2008. Experimental study on the activity of crude extracts from *Stephania* against coxsackievirus B₃ virus *in vitro* [J]. Jiangsu J Trad Chin Med, 40(9): 83-84. [郝静, 王一飞, 张美英, 等, 2008. 地不容粗提物体外抗柯萨奇 B₃ 病毒活性作用的实验研究 [J]. 江苏中医药, 40(9): 83-84.]
- HU Y, 2004. Fundamentals of microbiology and immunology [M]. Zhengzhou: Zhengzhou University Press: 190-196. [胡野, 2004. 微生物学与免疫学基础 [M]. 郑州: 郑州大学出版社: 190-196.]
- INTAYOUNG P, LIMTRAKUL P, YODKEEREE S, 2015. Anti-inflammatory activities of crebanine by inhibition of NF- κ B and AP-1 activation through suppressing MAPKs and Akt signaling in LPS-Induced RAW264.7 macrophages [J]. Biol Pharm Bull, 39(1): 54-61.
- JIN GZ, 1987. Pharmacologic progress of *l*-tetrahydropalmitine and it's second generation new drugs—*l*-Stepholidine [J]. Acta Pharm Sin, 22(6): 472-480. [金国章, 1987. 左旋四氢巴马汀和它的第二代新药——左旋千金藤啶碱的药理研究进展 [J]. 药学报, 22(6): 472-480.]
- KANEDA M, 1990. Lilioides a from *lilium longiflorum*: synthesis and absolute configuration [J]. Phytochemistry, 29(11): 3559-3564.
- LUO YL, LIAO ZZ, LIAO LQ, et al., 2017. Analgesic and anti-inflammatory effects of total alkaloid in *Stephania*

- kwangsiensis in vivo* [J]. Drug Eval Res, 40(10): 1424-1427. [罗昱澜, 廖曾珍, 廖露琴, 等, 2017. 广西地不容总生物碱体内抗炎镇痛作用研究 [J]. 药物评价研究, 40(10): 1424-1427.]
- LIU JH, YU BY, WANG Y, 2013. A process for separating alkaloids from Cordyamine by alkali silica gel: CN103214477A [P]. 2013-07-24. [刘吉华, 余伯阳, 王严, 2013. 一种利用碱化硅胶分离紫堇达明生物碱的工艺: CN103214477A [P]. 2013-07-24.]
- LE CVC, LE TL, NHI NPK, et al., 2019. Megastigmanes and flavones from *Polyalthia thorelii* collected in Nam Dong, Thua Thien Hue [J]. Vietnam J Chem, 57(2): 250-254.
- LIU ZM, HR JP, ZHONG XL, 2008. Betulinic acid and their active abstracted from *Camptotheca acuminata* by environmental method [J]. Environ Sci Technol, 31(1): 139-141. [刘展眉, 何洁萍, 钟雪莲, 2008. 用清洁方法从喜树果中提取白桦脂酸等有效成分 [J]. 环境科学与技术, 31(1): 139-141.]
- LI HB, 2006. Studies on the chemical constituents of *Sinomenium actum* (thumb) Rehd. et Wils [J]. J Guiyang Med Coll, 31(4): 344-345. [李海滨, 2006. 青藤生物碱成分的研究 [J]. 贵阳医学院学报, 31(4): 344-345.]
- LÜ Y, NIU YP, QU TM, 2001. Mechanism on magnoflorine against sport fatigue [J]. J Zhengzhou Univ (Nat Sci Ed), 33(4): 77-81. [吕莹, 牛英鹏, 曲天敏, 2001. 木兰花碱消除运动性疲劳的机理 [J]. 郑州大学学报(自然科学版), 33(4): 77-81.]
- LUO YL, LI J, MAO LJ, et al., 2015. Advances in studies on chemical constituents, pharmacology and quality control of alkaloids in *Stephania kwangsiensis* [J]. J Youjiang Med Univ Natl, 37(2): 304-306. [罗昱澜, 李江, 毛柳珺, 等, 2015. 广西地不容生物碱化学成分、药理及质量控制研究进展 [J]. 右江民族医学院学报, 37(2): 304-306.]
- PENG SL, CHEN L, ZHANG GL, et al., 1992. Studies on medicinal isoquinoline alkaloids—II. alkaloids of *Stephania brachyandra* [J]. Nat Prod Res Dev, 4(1): 14-18. [彭树林, 陈蕾, 张国林, 等, 1992. 药用异喹啉生物碱的研究—II. 白线薯生物碱 [J]. 天然产物研究与开发, 4(1): 14-18.]
- PAN QM, LI YH, HUA J, et al., 2015. Antiviral matrine-type alkaloids from the rhizomes of *Sophora tonkinensis* [J]. J Nat Prod, 78(7): 1683-1688.
- SHEN YQ, ZHANG MF, 1998. Antidiarrhea and anti-inflammatory effects of isocorydine [J]. NW Pharm J, 13(2): 67-68. [沈雅琴, 张明发, 1998. 异紫堇定的抗腹泻和抗炎作用 [J]. 西北药学杂志, 13(2): 67-68.]
- WANG XK, ZHAO TF, 1990. Distributions and biological activities of alkaloids from genus *Stephania* [J]. Chin Pharm J, 25(1): 3-6. [王宪楷, 赵同芳, 1990. 千金藤属植物中生物碱成分的分布及其生物活性 [J]. 中国药学杂志, 25(1): 3-6.]
- WANG JZ, LIAO J, LEI Y, et al., 2013. Study on the alkaloid constituents of *Cyclea racemose* [J]. W Chin J Pharm Sci, 28(1): 6-9. [王建忠, 廖静, 雷宇, 等, 2013. 轮环藤中生物碱成分的研究 [J]. 华西药学杂志, 28(1): 6-9.]
- WONGSIRISIN P, YODKEEREE S, POMPIMON W, et al., 2012. Induction of G1 arrest and apoptosis in human cancer cells by crebanine, an alkaloid from *Stephania venosa* [J]. Chem Pharm Bull, 60(10): 1283-1289.
- XU QM, CHEN GQ, FAN JY, et al., 2009. Chemical constituents of roots of *Boehmeria nivea* [J]. Chin J Chin Mat Med, 34(20): 2610-2612. [许琼明, 陈国庆, 范金胤, 等, 2009. 苧麻根化学成分研究 [J]. 中国中药杂志, 34(20): 2610-2612.]
- YING KQ, YAN YZ, DOU DQ, et al., 2007. Two new α -pyrones and other components from the cladodes of *Opuntia dillenii* [J]. Arch Pharm Res, 30(6): 665-669.
- YOSHIKAWA M, SHIMDA H, SAKA M, et al., 1997. Medicinal foodstuffs. v. moroheiya. (1): Absolute stereostructures of corchoionosides A, B, and C, histamine release inhibitors from the leaves of Vietnamese *Corchorus olitorius* L. (Tiliaceae) [J]. Chem Pharm Bull, 45(3): 464-469.
- YU ZP, MA YS, ZHAO ZX, et al., 1992. Antiarrhythmic effect of crebanine [J]. Chin J Chin Mat Med, 17(11): 685-687. [淤泽溥, 马云淑, 赵子仙, 等, 1992. 克班宁的抗心律失常作用 [J]. 中国中药杂志, 17(11): 685-687.]
- ZHANG XX, LI G, DENG Q, et al., 2021. Vomifoliol isolated from mangrove plant *Ceriops tagal* inhibits the NFAT signaling pathway with CN as the target enzyme *in vitro* [J]. Bioorg Med Chem Lett, 48(5): 128235.

(责任编辑 蒋巧媛 邓斯丽)